


[H] Chinese

14

Vol. XIV 1.34-1.35





尚德按連  
疑當作運  
尚德按血  
字上疑脫  
餘字疼字  
下疑脫及

唐王素先生外臺祕要方卷三十四目錄婦人下四十八門

產婦忌慎法六首

令易產方六首

下乳汁方一十五首

妬乳瘡痛方一十四首

乳癰腫方一十八首

產後血暈心悶方一十首

產乳連絕方五首

產後血不盡腰脚疼惡露不下方七首

產後惡露不絕方四首

產後血氣煩悶方四首

產後心痛方三首

產後腹中絞刺痛方九首

產後虛熱方二首

產後虛勞方四首

產後風虛瘦損方四首

產後虛羸方三首

產後中風方三首

產後下痢方四首

產後赤白痢方五首

產後冷熱痢方二首

產後痢日數十行方二首

產後卒患淋方五首

產後小便不禁兼數方四首

產後小便數兼渴方二首

產後渴方二首

許仁則產後方一十六首

產後遺糞方三首

產後陰道開方二首

產後陰下脫方六首

八瘕方一十二首

肉癰方二首

崩中方一十一首

崩中去血方一十三首

帶下方一十首

婦人虛羸及月病不能食方三首

陰蝕及瘡方八首

陰中腫痛方四首

陰中瘡方五首



尚德按陰  
字下疑脫  
中字

陰痿方五首

陰下脫方四首

女人傷丈夫頭痛方二首

童女交接他物傷方三首

坐藥方三首

陰痿有蟲方六首

陰挺出方三首

交接輒血出痛方二首

小戶嫁痛方四首

婦人欲斷產方四首



唐王壽先生外臺秘要方卷三十四

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

產婦忌慎法六首

千金論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不得令死喪污穢家人來視之則生難若已產者則傷兒也

又凡婦人產乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血惡物著地則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止

又凡產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死即母子俱病庶事皆不稱心能依圖無犯觸母子即得無疾子即易養

又凡欲產時特忌多人瞻視唯得三二人在旁待捱產訖即告語眾人也若人眾令人難產

又凡產婦第一不得忽忽忙怕旁人極須少靜皆不得預緩預急憂悵憂悵則難產若腹痛眼中火生此兒迴轉未即生也兒生訖一切人及母皆忌問是男是女兒胎落地即急取口中惡物與新汲井水五合

噉忌與煖湯物亦勿令母看視穢污  
又產婦慎熱食熱藥熱麵食常識此飲食當如人肌溫溫也

並出第  
二卷中

令易產方六首

千金令易產方 凡欲臨產時先脫尋常所著衣以籠竈頭及竈口令至密即易生神驗

又方 生地黃汁半升生薑汁半合煎熱頓服

又方 燒藥杵令赤內酒中飲之

小品同並出  
第二卷中

小品預服散令易生母無疾病未生一月日前預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺甘草

尚德按千金胎作始并作井

尚德按千金二味各半升



散方 甘草八分 黃芩 大豆黃卷 粳米 麻子仁 乾薑 桂心各二分 吳茱萸二分 右八味搗散酒

服方寸匕日三同千金

又療婦人易生產飛生丸方 飛生一枚 槐子 故弩箭羽各十枚 右三味搗末蜜丸桐子大以酒服二丸

即易產

又方 取蛇脫皮著衣帶中鑑翼繫衣帶臨欲產時左手持馬銜右手持飛生毛令易產並出第

下乳汁方一十五首

廣濟療婦人乳無汁方 以母猪蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩

以汁煮取六升去滓內葱白豉如常法著少米煮作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少許汗佳

乳未下更三兩劑甚驗崔氏同出第三卷中

千金療乳無汁漏蘆湯方 漏蘆 通草各八分 鍾乳四分 黍米一升 右四味切將米宿漬研取汁三升煮藥

三四沸去滓作飲服鍾氏同

又方 土瓜根末酒服半錢七乳日下如流水崔氏同

又療乳無汁單行石膏湯方 石膏四兩研以水二升煮三沸稍稍服一日盡良

又療乳無汁單行兔箭湯方 兔箭五兩水六升煮取四升去滓一服八合日三服亦可燒灰作末水服

方寸匕日三

又下乳汁通草散方 通草 鍾乳研 右二味等分為散麵粥服方寸匕日三百日後可兼養兩兒

又麥門冬散方 麥門冬法鍾乳研 通草 理石各等分 右四味搗散食前後酒服方寸匕日三

又下乳漏蘆散方 漏蘆二分 鍾乳五分 栝蓂五分 蟾蜍三分 右四味搗散食後炒糖水下方寸匕日三

又方 母猪蹄一具廩切以水二升煮令熟餘五六升汁飲之甚良崔氏同

又方 猪蹄二枚 通草八兩 右二味以清酒一斗浸之稍漸飲盡不出更作崔氏同

尚德按千金不用酒 尚德按千金作 尚德按千金 栝蓂根各 一兩蟾蜍 三合并炒



尚德按得  
尚德按三服  
尚德按一  
升半金作  
字之訛

尚德按大  
者千金作  
大核

尚德按浸  
千金作浸  
下並同

又方 栝蒌根切一升酒四升煮三沸去滓服半升日三良崔氏同

又方 栝蒌青色大者一枚熟搗以白酒一升煮取四升去滓溫飲一升日三若無大者用小者兩枚無

青色者黃色者亦好崔氏同

又方 燒鯉魚頭末酒服三指撮

又方 燒死鼠酒服灰方寸匕日三立下並出第

崔氏療乳汁不下方 鼠肉兩五羊肉兩六麝肉兩八 右三味合作臙噉之勿令食者知出第十

妬乳瘡痛方一十四首

集驗論療婦人妬乳乳癰諸產生後宜勤擠乳不宜令汁畜積不去便不復出惡汁於內引熱溫壯結堅

掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成妬乳非癰也方 始妬乳急炙兩手魚際各二七壯斷癰脈也使可

令小兒手助擠之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯汁自下外以小豆散薄塗之癰處當差千金同

又產後不自飲兒及失兒無兒飲乳乳畜喜結癰不飲兒令乳上腫者方 以雞子白和小豆散塗之乳

房令消結也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大者子含水使漱口中冷為咽取乳汁吐去之不含水

漱令乳頭作瘡乳孔塞也千金同

又療妬乳乳癰連翹湯方 連翹 升麻 杏仁去皮射干 防己 黃芩 大黃 芒硝 柴胡各三

芍藥 甘草四兩 右十一味切以水九升煮取三升分服忌海藻松菜千金同

又方 取葵莖燒灰搗散服方寸匕日三即愈千金同

又療妬乳生瘡方 蜂房豬甲中土車轍中土各等分末苦酒和塗之良千金同 一方又有

又療婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出侵淫為長百療不差者動經年月名為妬乳病婦人飲兒

者乳皆欲斷世論芍乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傳二物飛烏膏及飛烏散佳始作者可傳

以黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並佳方如左赤龍皮湯方 檨皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之



秋冬溫之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗畢傅膏散

又天麻草湯方 天麻草切五升以水一斗半煎取一斗隨寒溫分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉又生

夏著花赤如鼠尾花亦以洗侵淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡洗畢傅膏散千金

又飛烏膏散方 用燒硃砂作水銀上黑烟一名細粉礬石三兩右二味以絹篩了以甲煎和之令如

脂以傅乳瘡目三作散者不須和有汁自著可用散亦傳諸熱瘡黃爛侵淫汁瘡蜜瘡文夫陰蝕痒濕

諸小兒頭瘡疳蝕口邊肥瘡蝟瘡等並以此傳之千金

又黃連胡粉膏散方  
黃連<sub>二兩</sub>胡粉<sub>十分</sub>水銀<sub>一兩</sub>  
兩同研消散  
右三味搗黃連為末  
三物相和合皮裏熟按之

自和合也縱不成一家且得水銀細散入粉中也以傳乳瘡諸濕痒黃爛肥瘡若著甲煎為膏千金同

備急小  
品妬乳  
方治乳  
癰堅  
黃芩  
白斂  
芍藥  
右三味下篩漿水服一錢五匕日三若右

乳結將去左乳汁左乳結即將去右乳汁服即消同

又方 柳白皮酒煮令熟以熨上即消

又方 若酒磨升麻若青木香或紫檀香以厚土並良一味即得佳

又方已入腹者薑陸香青木香雞舌香各一兩以水四升煮取二升分再服忌食麪泥牛馬肝肉

以效瘡婦人妬乳瘡瘡邊愈五物雄黃龍女膏方雄黃白銀此黃龍女並切商鬚一枚

右以猪脂半斤合煎三沸去滓乃内鬚髮盡藥成以塗瘡不逼十日差

乳癰腫方一十八首

廣濟療乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍方  
大黃 芍藥 棟實 馬蹄炙令黃 右四味搗

散酒服方寸匕覆取汗當睡著覺後腫處散不痛經宿乃消百無失一明晨更服一匕忌極風熱食

深師瘰癧腫消核芍藥散方 芍藥 通草 桂心 昆布 白斂 附子炮黃耆 人參 海藻

木占斯各一兩 右十味搗散以清酒服一錢七日三當先食并療頤下氣結瘰癧



尚德按乾  
薑千金作  
生薑

又乳癰眾醫不能療柏皮膏方 猪膏年多者佳柏皮三斤去黑皮以猪膏煎之當稍稍煎柏皮熟黑便

瀉出更煎餘柏皮如初盡以塗瘡甚驗

集驗療乳癰方

大黃<sup>二兩</sup>莽草<sup>二分</sup>伏龍肝<sup>十二分</sup>乾薑<sup>二分</sup>

右四味搗末以酢和塗乳上即效止一方生薑

極驗可用也<sup>千金</sup>

又方 取鹿角下篩散以猪領下清汁服方寸匕不過再服亦以醋漿服之良<sup>千金云猪脂</sup>

又療乳癰四物膠薄貼方 膠<sup>炙</sup>大黃 莽草 細辛 右各等分搗末以雞子白和塗紙上貼腫頰易

晝夜貼之割紙穿如錢大出腫頭

又療乳癰三物桂心貼方

桂心<sup>三分</sup>烏頭 甘草<sup>各二分</sup>

右搗散以苦酒和塗腫上以小紙覆濡其上將

乳居其中以乾布置乳下須臾布當濡有膿水也<sup>佳說注</sup>

千金翼排膿散主乳癰方

鐵粉 茯苓 桂心 細辛 芎藭 人參 防風 乾薑 黃芩 芍藥

各四當歸 甘草<sup>五分</sup>

右十二味搗散酒服方寸匕日三夜一加至一匕半服藥十日血出多勿怪

是惡物除甚良<sup>出第五卷中</sup>

備急葛氏療婦人乳癰妬腫者或經久眾療不差方

堅硬紫色削柳根皮搗熟熬令溫帛裹熨乳上

冷更易甚良一宿即愈<sup>千金</sup>

又方 研米槌二枚煮令熱以絮及巾覆乳上用二槌更互熨腫數十過差上已用大驗<sup>千金云</sup>

又乳癰方 大黃 覆下黃土<sup>各一分</sup>生薑<sup>二分</sup>

右三味搗末醋和塗乳痛即止極驗劉涓子不用生薑用

生魚三味等分余比用鯽魚妙

又療乳癰方 大黃 鼠屎 黃連<sup>各一</sup>

右三味搗末合鼠屎更搗以黍米粥清和傳乳四邊痛止即

愈與黍米粟米粳米並可用<sup>千金</sup>

救急療乳癰腫痛如升梳大痛不可忍方

取白薑石搗末一二升用雞子白和如稀泥傳腫乾更易之



此方頻試驗如雞子處罪取榆白皮和搗傳即差

又療乳癰堅硬痛不可忍方 芎藭子半大匙當年新者服時不得嚼破以清水一大盞和頓服痛即止

又療乳癰腫方 以醋研地黃塗上乾即易不過三五遍服以酒研之

必效療婦人乳癰方 覺痛色未變時以飼猪米研汁飲之即差仍取猪槽木厚如匙面火炙數數熨上

又療婦人乳癰丹參膏方 丹參 白芷 芍藥各二兩 右三味咬咀以苦酒淹經宿又取猪脂半斤微

火上煎之白並黃膏成去滓以膏塗上甚良

又療瘡上須貼膏方 黃耆分 白芷 大黃各五兩 當歸 續斷各四兩 薤白二合 松脂計二 薑陸香 蠟各

分猪脂一升 生地黃汁合 右十一味切內地黃汁中清半日內猪脂中微火上煎三上三下白芷色黃

膏成布絞去滓剪帛如瘡大小塗常貼瘡上日四五度易之終身無苦極效

產後血暈心悶方一十首

廣濟療產後血暈心悶不識人或神言鬼語氣欲絕方 荷葉二枚 蒲黃一兩 甘草二兩 白蜜一匙 地黃汁半升

右五味切以水三升煮取一升絞去滓下蒲黃蜜地黃汁煖服立差止

又療產後心悶血氣衝上血暈羚羊角散方 取羚羊角一枚燒成灰末以東流水服方寸匕若未差更

服差

救急產暈心悶大困方 鯽魚剝皮作鱠以薑食三兩口止

文仲暈絕方 蘇方木三兩碎以水五升煎取二升分再服或無蘇木煮緋色衣取汁服甚驗

又方 取牆上青衣一抄以水四小升煮取二升分服又生薑汁一小升地黃汁一小升酒一大升相和

煎五六沸分再服每劑和大黃末一匙此方甚良

崔氏凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空所致欲分曉者第一須先取驗醋以塗口鼻仍置醋於旁使聞

其氣兼細細飲之此為上法如覺暈即以醋噴面蘇來即飲醋仍少與解之一云仍少與水解之

尚德按驗  
疑當作驗



尚德按證  
類引此方  
良久作亦  
尚德按人  
疑當作久

又凡產後忽問胃汁山不知人者是暴虛故也方 取破雞子吞之便醒若未醒可與童子小便一升其  
驗丈夫小便亦得切不得用病人者

又若久不識人或時復發者此為有風因產血氣暴虛風行脈中故也若產後去血多者尤增此疾與雞  
子不醒者可急與竹瀝汁一服五合須臾不定復與五合頓得三五服立差並出第十卷中

近效療血暈絕不識人煩悶方 紅藍花三兩新者佳以無灰清酒半升童子小便半大升者取一大盞  
去滓候稍冷服之新汲水一大升者之良久

又方 赤父馬薑絞取汁一大盞濕者良若乾者取新汲水半大盞和研絞取汁頓服亦主人血不止神  
驗夏錄極錄

產乳暈絕方五首

崔氏療產乳暈絕方 以惡血服少許良

又方 以服洗兒水三合良

又方 覺暈即用三股麻繩長五六尺繫產婦右腳膝上令人捉兩頭急挽得醒徐徐解之並出第十卷中

文仲療產乳暈絕方 半夏一兩洗搗篩丸如大豆內鼻中即愈崔氏

救急療產乳暈絕方 生赤小豆搗為散取東流水和方寸匕服之不差再服崔氏

產後餘血不盡腰脚疼及惡露不下方七首

廣濟療產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手脚疼不下食生地黄湯方 生地黄汁升芍藥 甘草各二

服三合日二夜三利一兩行中間進食與藥更進服

又療產後惡露不多下方 牛膝 大黃各八牡丹皮 當歸各六芍藥 蒲黃 桂心各四 右七味

搗散以生地黄酒服方寸匕日二服下止



尚德按千金只用此  
酒與者當  
歸說  
尚德按此  
疑當作

救急療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胸急氣滿兩脇痛方 生薑一斤淡竹葉一升 右二味以水二升煮取一升去滓分再服

又療產後血不盡血痛悶方 取荷葉燒作灰煖水和服者取汁亦良

又惡露不盡腹脹痛方 取亂髮如雞子大灰汁洗淨燒末酒服

又方 取百斤秤鍾一枚燒赤投酒五升中用此秤鍾酒煮當歸三兩取三升去滓分再服

又療一切宿血及損傷瘀血在腹內不問新久并婦人月經不通產後惡血不下皆良方 大黃 芒硝 各三升 桃仁四十枚 右三味芒硝桃仁合搗四五百杵以酢漿二升半清一宿空腹攪調頓服之不能

頓服者分作兩服良久先下糞次下如豆泥汁或黑血為驗強人別服一劑弱人兩日服之下血盡便止不過三兩劑忌生冷茶葵

產後惡露不絕方四首

廣濟療婦人產後血露不絕胸血不可禁止腹中絞痛氣急急療婦病三十六疾方 亂髮燒灰阿膠各二

代赭 乾薑 馬蹄 乾地黃 牛角 右七味搗篩蜜和為丸如梧桐子空腹以飲下

二十五丸日二至四十丸良

深師療產後虛冷下血及水穀下痢晝夜無數兼療惡露不絕龍骨丸方 乾薑 甘草 桂心 龍

骨 右四味搗篩蜜丸如梧桐子大以酒下二十丸日三忌如常法此方甚良

文仲葛氏療血露不絕方 以鋸截桑木取屑五指撮酒服日三差

又隱居效方澤蘭湯療產後惡露不盡腹痛往來兼滿少氣 澤蘭 生地黄 甘草 六分 生薑 大棗 右七味切以水九升者取三升分為三服欲死達身得差

產後血氣煩悶方四首

廣濟療產後心中煩悶血氣溫肋下妨不能食方 生地黃汁一當歸一兩 生薑汁三酒五童子小便



尚德按千金小多三合甘單二雨生薑三兩有茯苓三兩分三服少食無穀飲者加棗米五合

通按下一作下利煩躁一作

升二 右五味和煎三四沸去滓分服一日令盡間食服

又血氣煩悶方 取生藕搗絞取汁飲一升未定更飲差止竹瀝亦得千金

集驗療產後血氣煩悶方 取生地黃汁一升酒三合和微溫頓服之千金

千金療婦人產後氣欲絕心中煩悶不解方 竹葉切麥門冬洗小麥升一甘草一雨生薑二大棗

十四 右六味切以水一斗煮竹葉小麥取八升去滓內餘藥煮取三升去滓分服心虛悸加入參二

兩少氣力加梗米五合一方用竹皮若胸中氣逆加半夏二兩忌如常法出第三

產後心痛方三首

集驗大蠶蜜湯療產後心痛方 乾地黄 當歸 獨活 甘草炙芍藥 桂心 小麥 細辛各一吳

茱萸升乾薑兩三 右十味切以水九升煮取三升分三服良千金同尚德按十

經心錄蜀椒湯療產後心痛此大寒冷所為方 蜀椒二合芍藥兩三半夏洗當歸 桂心 人參 甘草

二兩生薑汁五合蜜升一茯苓兩二 右十味切以水九升煮椒令沸下諸藥煮取二升半去滓下薑汁蜜等

更煎取三升一服五合漸至六合盡勿冷食千金

千金羊肉湯療產後腹中水下切痛不能食往來寒熱若中風乏氣力方 羊肉三斤當歸 黃芩 甘草

炙芍藥 防風各二芍藥三雨生薑四分 右八味切以水一斗二升煮羊肉減半煮藥取三升分溫三服

忌如常法第三卷中

產後腹中絞刺痛方九首

廣濟療產後腹中絞刺痛不可忍方 當歸 芍藥 乾薑 芍藥各六 右四味搗散以酒服方七日

二服尚德按方字

又療產後內虛寒入腹腹中絞痛下赤煩毒譫語見鬼羊肉湯方 肥羊肉斤當歸 甘草炙芍藥各一

右四味切以水一斗煮羊肉取七升煮藥取二升分服

下 卷之五 八十三日 產後心痛方三首 產後腹中絞刺痛方九首

五



尚德按耳  
疑當作翮

尚德按千  
金取三升  
尚德按千  
金取二升  
升計中分  
之頓服一

尚德按千  
金取三升

又療新產後腹中加弦常堅絞痛與聊方 蜜升當歸一 右一味末入蜜中煎融融耳遠寒溫頓服

千金當歸湯療婦人寒病虛勞不足若產後腹中絞痛方 當歸三 生薑五 芍藥二 羊肉一斤 右四味切

以水八升者取三升適寒溫頓服七合日三

又療產後疾痛桃仁芍藥湯方 桃仁半升去 芍藥 當歸 芎藭 乾漆熬 桂心 甘草二 右七

味切以水八升者取二升半分三服

又單行萊菔酒療產後腹內外疾痛方 吳萊菔一升酒三升漬一宿煎取半升頓服亦可再服差止此

第三卷中  
必效療產後腹痛方 羌活四兩切酒二升煮取一升分服

又方 免頭炙令熱以熨產婦腹如刀絞痛者熨之立定

又療痛不可忍方 取一苦瓠蘆未經開者開之去子訖以沸醢酢投中蒸熱隨痛熨冷即換極甚效

產後虛熱方二首

千金蜀漆湯療產後虛熱往來心胸中煩悶滿骨節疼及頭痛壯熱晡時輒甚又似微瘧方 蜩母 芍

藥各二 蜀漆葉 甘草 桂心 黃芩各一 生地黃一斤 黃耆兩五 右八味切以水一斗先煮地黃取七

升去滓下諸藥煮取二升半分三服此湯療寒熱不損人忌如常法出第三卷中

千金翼療產後虛熱頭痛方 白芍藥 乾地黃 牡蠣各五 桂心三 右四味切以水五升煮取二升

半分三服日三服不損人無毒亦療腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩甚驗大熱即除出第六卷中

產後虛勞方四首

千金增損澤蘭丸療產後百病理血氣補虛勞方 澤蘭 甘草 當歸 芎藭各一 附子炮 乾薑 白

朮 白芷 桂心 細辛各四 防風 人參 牛膝各五 柏子仁 乾地黃 石斛各六 厚朴 艾葉各本

蕪夷各一 麥門冬八分 右二十味搗末蜜丸以酒下十五丸至二十九丸忌如常法出第四卷中



延年增損澤蘭丸主產後風虛勞損黃瘦方 澤蘭分防風 乾地黄 當歸 細辛 桂心 茯苓

芍藥 人參 甘草炙 薑本 烏頭炮 麥門冬去心 石斛 紫苑 芎藭各五 乾薑 柏子仁 蕪荑仁

厚朴炙 蜀椒汗各四分 白朮 黃耆各六分 紫石英研 石膏研各六分 右二十五味搗篩蜜和丸如梧桐子以酒

下二十至三十丸忌如常法

刪繁療產婦虛勞或本來虛寒或產後血脈虛竭四肢羸弱飲食減少經水斷絕血脈不通虛實交錯澤

蘭補虛丸方 澤蘭葉九分 石膏八分 芎藭 甘草炙 當歸各七分 白芷 防風 白朮 薑本 蜀椒 厚

樸炙 乾薑 桂心 細辛各五分 右十四味搗篩蜜丸如梧桐子酒下二十九至三十丸日再忌如常

法

古今錄驗澤蘭丸療產後風虛勞羸百病必效方 澤蘭葉六分 白芷 椒汗 蕪荑仁 薑本 細辛各四分

白朮 柏子仁 人參 桂心 防風 厚朴炙 丹參各五分 芎藭 甘草炙 當歸各七分 乾地黄分 右

十七味搗篩蜜和丸如梧桐子服二十九至三十九日再服忌如常法

產後風虛瘦損方四首

廣濟療產後患風虛冷氣腹內不調補益肥白悅澤方 澤蘭分 厚朴炙 人參 石斛 蕪荑仁 續斷

防風 桂心各三分 芎藭 白朮 柏子仁 五味子 黃耆 遠志皮各四分 赤石脂 乾地黄 甘草

各六分 右十七味搗末蜜丸如梧桐子以酒二十丸至三十九日再忌如常法

小品療產後中風虛人不可服他藥者一物獨活湯主之及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮之方

獨活三兩以水三升煮取一升分服素酒者亦可酒水等者之用白鮮皮亦依此法

千金云凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此

早行房故也又產後七日內惡血不盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯痛甚切者不在此例後兩三

日消息可服澤蘭丸比至滿月丸藥益為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸



尚油桂  
金上上  
上分  
下有  
應作  
合

尚德按  
大

又凡在華必須服澤蘭丸補服法必七日外不得早服也婦人因產取涼太多得風冷腹中積聚百病競起迄至於老百方療不能差桃仁煎主之出產後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一兩劑以至於常將服之

又桃仁煎療萬病婦人產後百病諸氣方 桃仁一十二百枚去雙仁尖皮熬令香 右一味搗務令極

細熟以上上酒一斗五升研三四遍如作麥粥法以極細為佳內小長項甕瓶中令滿以麵遍封之務

取密內湯中煮一伏時不停火使瓶口常出湯勿令沒藥成溫酒和服一匙日再丈夫服亦極妙

延年澤蘭丸主產後風血損瘦不能食令肥悅方 澤蘭六分當歸十分甘草七分 薑本三分厚朴三分 食萊菔

黃白芷 乾薑 芍藥各三 石蜜八人參 柏子仁 桂心 白朮 右十五味搗篩蜜和

為丸如梧桐子大酒服十五丸日二加至二十五丸忌如常法

產後虛羸方三首

廣濟療產後虛羸喘之或乍寒乍熱狀如驚名為勞損諸腎湯方 猪腎一具去脂 白梗米 葱白

一升人參 當歸各二 右六味切以水一斗煮取三升去滓分服七合以意消息忌太肉熱麵蒜

救急療產後氣弱不復令肥白方 烏頭肥大者淨洗熟如造豆黃法去皮搗為屑下篩以臘月猪脂

成鍊者扣丸如梧桐子以酒下五十九日再服一月內肥白也無所忌

古今詳驗療產後諸病羸瘦飲令肥白飲食和調地黃羊脂煎方 生地黃汁一升生薑汁五升羊脂二升白蜜

升 右四味先煎地黃汁令餘五升下羊脂煎減半次下薑次下蜜使以銅器盛著湯中煎令如飴狀

蜜肚酒一升取煎如雞子大投酒中飲日三良

產後中風方三首

深師療產後中風口喎不語人小解活湯方 獨活八兩葛根六兩生薑五兩甘草二兩 右四味切以水九升



煮取三升分三服微汗佳忌如常

山第六卷中

小品大豆紫湯主婦人產後中風困篤或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身痒劇者嘔逆直視

此皆因風冷濕所為方 大豆三升炒預取器盛清酒五升沃熱豆中訖灑去豆得餘汁盡服之溫覆取

微汗出身體纔潤則愈一以去風二則消血結云周德成妻姪胎因觸傷胎死在腹中三日困篤服此

酒即差後療無不佳千金用大豆五升酒八升又云更合獨活湯所以病者產後多虛若風以獨活消風去血也重者十劑崔氏云如中風口噤如雞爪白二升加豆豉更佳

又療產後中寒風症通身冷直口噤不知人方 白朮四兩酒二升煮取一升去滓頓服忌如常法

產後下痢方四首

廣濟療產後腹痛氣脹肋下妨滿不能食兼之微痢方 茯苓 人參 厚朴各八分甘草炙橘皮 當歸

黃芩各六分 右七味搗散以飲下方寸匕日三度漸加至一匕半

又療產後下痢赤石脂丸方 赤石脂兩三甘草炙當歸 白朮 黃連 乾薑 秦皮各二兩蜀椒汗附子

一兩各 右九味搗篩蜜和為丸如桐子酒服二十丸日三良忌如常法

深師療產後下痢膠蠟湯方 粳米合蠟一升阿膠雞子當歸各六分黃連分 右五味切以水六升半先

煮米令蟹目沸去米內藥煮取二升入阿膠蠟消洋溫分三兩服

千金療產後下痢腹痛當歸湯方 當歸 龍骨各三兩乾薑兩白朮兩甘草炙附子炮熟艾一兩芎藭

二兩 右八味切以水六升煮取二升半去滓分為三服日三令盡山第三卷中

產後赤白痢方五首

廣濟療產後赤白痢臍下絞痛方 當歸 芍藥 地榆 龍骨 黃連各八分艾葉 甘草 厚朴各八分

黃芩 乾薑各六分 右十味切以水八升煮取二升半去滓分溫三服即差止忌如常法

又療產後赤白痢臍下氣痛方 當歸厚朴黃連各二升豆蔻五枚甘草六分 右五味切以水五升

煮取二升去滓分溫三服差止忌如常法

尚德按洋  
誤當作洋  
金乾薑二  
兩附子一  
兩煎取二  
升



文仲效方療產後赤白下痢腹中絞痛不可忍者 黃連四兩黃柏三兩阿膠炙梔子一兩蒲黃各一兩當歸一兩

黃芩二兩右七味搗篩蜜和為丸飲服六十九日三夜一服立定破血止痢忌如常法

救急療產後下痢赤白腹中絞痛方 芍藥四兩乾地黄各四兩甘草炙阿膠炙艾葉當歸右六味

切以水三升煮取一升半去滓溫分三服忌如常法

必效療婦人新產後赤白痢心腹刺痛方 薤白切一當歸二酸石榴皮三兩地榆根四兩梗米五合一本加厚

朴兩阿膠人參甘草炙黃連各半右十味切以水六升煮取二升分三服忌如常法千金只用

產後冷熱痢方二首

深師療產後冷熱痢黃連丸方 黃連三兩烏梅肉一升乾薑二兩右三味搗末蜜丸如桐子以飲下二十至

三十丸日再服忌猪肉

千金療產後忽著寒熱下痢生地黃湯方 甘草炙黃連桂心各一兩生地黃切五兩大棗二十枚淡竹皮

生石脂各一兩右七味切以水一斗煮竹皮取七升去滓內藥煮取二升半分為三服日三翼同出單

產後痢日夜數十行方二首

千金療產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血桂枝湯方 桂心乾薑甘草炙各二兩赤

石脂兩當歸三兩附子炮一兩蜜一升右七味切以水七升煮取三升入蜜一兩沸分服一升日三

必效療產後痢日五十行者方 取木裏蠹蟲薑鏹中炒之令黃急以水沃之稀稠得所服之差止藥酒

方納

產後卒患淋方五首

廣濟療產後卒患淋小便碇痛乃至尿血方 冬葵子一升石葦去毛通草各三兩滑石四兩茯苓各二兩

右六味切以水九升煮取三升絞去滓一服七合差止忌熱麪酢物

集驗療產後卒患淋石葦湯方 榆白皮五兩石葦去毛黃芩各三兩通草三兩大棗二十枚葵子一升白朮一兩右七

尚德按千金名桂蜜湯以水六升煮

尚德按千金作忍



尚德按十  
金前字下  
有子字  
作練  
尚德按十  
金滑石五  
兩  
尚德按十  
金甘草二  
兩

尚德按十  
金大葉十  
四枚

味切以水八升煮取二升半分為三四服千金有甘草

千金療產後淋瀝葵根湯方 葵根二兩車前一兩亂髮大黃桂心 滑石末後下冬瓜汁七通草二

生薑六兩右九味切以水七升煮取二升半去滓分三服卷中

又產後淋滑石散方 滑石五兩通草 車前子 葵子各四兩右四味以漿水服方寸匕至二匕為妙

千金翼療產後卒淋氣淋血淋石淋湯方 石葶去黃芩通草各二兩榆白皮五兩大棗三十枚甘草一兩葵

子二升生薑 白朮各三兩右九味切以水八升煮取二升半分三服千金

產後小便不禁兼數方四首

廣濟療產後小便不禁方 取雞尾燒作灰酒服方寸匕日二服

小品療產後小便不禁方 取雞子燒作灰酒服日三

又療產後遺尿不知出方 白薇 芍藥各等分右二味搗散以酒服方寸匕日三千金翼

千金翼諸產後小便數桑螵蛸湯方 桑螵蛸三十枚鹿茸炙黃耆各三兩人參 甘草炙牡蠣各一兩生薑四兩

右七味切以水六升煮取二升半分三服日再差止

產後小便數兼渴方一首

集驗產後小便數兼渴枯薑湯方 桑螵蛸炙甘草炙黃連 生薑各二兩栝蒌 人參各三兩乾薑五十枚

右七味切以水七升煮取二升半分三服

產後渴方二首

集驗產後渴枯薑湯方 栝蒌四兩麥門冬去心人參 乾地黄各三兩甘草二兩乾薑二十枚土瓜根五兩右

七味切以水八升煮取二升半分三服良

千金療產後虛渴少氣力竹葉湯方 竹葉切甘草 人參 茯苓各一兩小麥五合生薑 半夏洗各乾

右九味切以水九升先煮竹葉小麥生薑取七升去滓內藥再煎取二升半

金大葉十 四枚



絞去滓一服五合日三夜一出第三卷中

許仁則產後方一十六首

第一產後若覺血氣不散心腹刺痛脹滿喘急不能食飲宜依此方 芎藭<sub>折之如當歸</sub> 白朮<sub>生</sub>

薑<sub>路三</sub> 細辛<sub>桂心各二</sub> 生地黃<sub>汁五合</sub> 右七味切以好無灰酒三升水四升和煎緩火煎取二升三

合去滓溫分服三合忌如常法

第二產後若覺惡露下多心悶短氣貼然無力不能食宜依此方 當歸 艾葉 生薑<sub>各三</sub> 乾地黃<sub>四</sub>

人參<sub>兩一</sub> 地榆<sub>兩一</sub> 右六味切以水七升半煎取二升四合去滓分溫服八合日三

第三產後惡露下多少得所冷熱得調更無餘狀但覺腹內切痛可而復作宜依此方 當歸<sub>兩五</sub> 生薑<sub>兩六</sub>

桂心<sub>兩三</sub> 芍藥<sub>兩二</sub> 右四味切以水酒各三升半煮取二升三合去滓分溫三服之忌生葱

第四產後諸狀無所異但不能食者宜依此方 白朮<sub>兩五</sub> 生薑<sub>兩六</sub> 右二味切以水酒各二升緩火煎取

一升半分溫二服忌如常法

第五產後更與他狀但覺虛弱欲得補氣力兼腹痛宜羊肉常歸湯方 肥羊肉<sub>一斤去脂膜</sub> 當歸<sub>兩五</sub> 生薑<sub>兩六</sub>

黃耆<sub>兩四</sub> 右四味切以水一斗緩火煮羊肉取八升澄清內藥煮取二升半去滓溫分服若覺惡露下

不盡加桂心三兩惡露下多覺有風加芍藥三兩覺有氣加細辛二兩覺有冷加吳茱萸一兩覺有熱

加生地黃汁二合

第六產後惡露雖下不甚通利遂覺心腹滿悶脇肋脹妨兼欲喘息急不能食飲大便不通服溫坐起不

穩心腹時痛宜服此方 白朮 當歸 桑白皮 大黃<sub>各三</sub> 生薑<sub>兩四</sub> 細辛<sub>兩二</sub> 桂心<sub>兩二</sub> 右七味切

以水八升煮取二升六合去滓分溫三服此湯當得利利又不宜過多事不獲已所以取微利緣初產

舉體皆虛尚難食補之豈宜取過利脫未即止須斷之取三兩是酢飲飲之即止適寒溫將攝佳忌

如常法

如利後諸候不減宜休後方一當歸白朮八分甘草七分生薑桑根白皮桂心六分人參各三分細辛

四右八味搗篩蜜丸桐子大以酒下十五至二十九忌如常法

第七產後患水痢宜依此方神輔五合六分人參四兩枳實六分赤石脂十分白朮六分右五味搗散飲下

方寸匕漸漸加之忌如常法

第八產後患血痢宜依此方艾葉虎掌者三月三日者黃柏芍藥甘草六分阿膠十分黃連七分地榆五分

右七味搗散以飲下方寸匕甚妙忌如常法

第九產後患膿痢宜依此方附子地黃附子乾薑各五分甘草六分赤石脂黃耆白朮各十分右七

味搗散飲服方寸匕加一匕半日再忌如常法

第十產後諸痢方取薤白煮食之唯多益好肥羊肉去脂作炙食之唯多益好以羊腎炒薤白食之良

第十一產後腹內安穩惡露流多少得所但緣產後日淺久坐視聽言語多或運勞力遂覺頭項及百肢

節皮肉疼痛乍寒乍熱此是勞勞宜依此方猪腎去脂當歸芍藥生薑桂心三兩白合右

六味切以水八升緩火煮腎取六升澄清內諸藥煮取二升分溫再服

第十二產後覺患風手足不多隨和言語不多流利恍惚多忘精神不足宜依此方獨活當歸芍藥

藥防風芍藥玄參桂心一兩右七味切以水八升煮取二升半去滓分三服如一劑覺

安穩隔三日又服一劑若一兩劑後漸差但須通寒溫將息如未全差即以此方作丸有熱加乾薑五

兩有冷加白朮五兩有氣加生薑六兩有痛加當歸芍藥各二兩不能食加人參二兩玄參四兩覺手

足不穩加牛膝五加皮草解各三兩黃耆四兩丸服忌如常法

第十三產後更無餘苦但覺體氣虛宜服此方當歸乾地黃各十分澤蘭八分防風黃耆續斷各六分

桂心人參地黃皮芍藥乾薑各七分右十一味搗末蜜丸桐子大酒下二十丸忌如常法

第十四產後不論服藥宜爾不宜食諸生冷陳久滑物若服藥彌須將息每方服藥後合疏忌食法為欲



錄其都要下能一一具言諸方有白朮忌桃李細辛忌生葱甘草忌松葉海藻枸杞忌狗肉附子黃連忌諸肉杜心忌生葱

第十五產後血氣不多通散當時不甚覺之在薛雖小不和出則成痼結少腹疼硬乍寒乍熱食飲不為肌膚心腹有時刺痛口乾唾粘手足沉重有此狀宜依此方 當歸 芍藥 人參 甘草 芎藭 牛膝 各五壯丹皮 白朮 各六桂心 白薇 烏梅 各四分 大黃 八分 蠱蟲 去水蛭 熱蒲黃 各三分 硝石 各十

赤石脂 各十 乾地黄 各六 虎杖 各六 右十九味搗末蜜丸桐子大酒服二十丸日再加二十五丸良忌如常法

第十六產後腹血痢相兼宜依此方 赤石脂 五色龍骨 黃連 各十 阿膠 炙黃耆 各六 黃柏 各四分 白朮 各五 右七味搗末蜜丸桐子大飲下三十九丸散服亦妙如前服忌如常法

產後遺糞方三首 廣濟療產後遺糞方 取故驚蟻中草燒末以酒下半錢亦治男子

集驗療產後遺糞方 取礬石燒壯蠅熬各等下篩酒服方寸日三亦治男子 又療產後遺糞不知出時方 白飯 芍藥 各二 右二味搗為散以酒服方寸匕

產後陰道開方二首 廣濟療產後陰道開不開方 取石灰一升熬令能燒草以水二升投灰中適冷煖入水中坐漬須臾復

煖坐如常法用之 集驗療婦人產後冷玉門不開硫黃洗方 石硫黃 研蛇牀子 各四分 菟絲子 五兩 吳茱萸 各六 右四味搗

散以湯一升投方寸匕以洗玉門差止 產後陰下脫方六首 集驗療婦人產後陰下脫方 取蛇床子一升布裏炙熨之亦療陰中痛

尚施扶等字下疑脫字 下疑脫已字

尚德按千金產後論又傳載精又布推肉之藥後酒服

尚德按主疑當作生

通按此條有錯簡不致妄正

千金產後陰下脫方 以鐵精粉上推內之

又方 燒人尿味酒服方寸匕日三度

又方 臍下橫文灸二十七壯

古今錄驗產後陰下脫方 蜀椒 吳茱萸各一升 戎鹽半雞子大 右三味搗以綿裹如半雞子大內陰中

日一易二十日愈

又方 鼈頭陰乾 葛根一 右二味搗散酒服方寸匕日三

### 八癩方一十二首

素女經論婦人八癩積聚無子斷絕不主令有子受胎養法并曾傷落依月服藥法及陰閉生息肉陰痒生瘡陰痒發瘡帶下陰子藏不正陰門挺出陰腫堅隱疾方

黃帝問於素女曰吾聞天下婦人產乳有子而病者未曾生子而病者又產乳後而中絕不復產者何也諸病作生而令婦人腹中有積聚胸脇腰背攣而痛久而生八癩之聚病深可畏不在腸胃療之或已復作其狀甯可得聞之乎對曰婦人之病皆由於月病生產所致又從胞胎所起其病不同鍼灸食藥不得其方也

黃帝曰安心其要易聞之為實受之良久詳思念其事曰善哉療將奈何素女曰誠為主說婦人胞胎之數皆在陰裏萬物皆從生淵深血脈精氣所從行腎為陰陰主開閉左為胞門右為子戶主定月水生子之道胞門生於子精精神氣所出入合於中黃門玉門四邊主持關元禁閉子精臍下三寸名曰關元主藏魂魄婦人之胞三隻之府常所從上然婦人經脈俞絡合調則月水如時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通其人思惟邪氣便得往來入合於子藏若生後惡露未已合陰陽即令婦人經脈攣急令人少腹裏急支滿胸脇腰背相引痛苦四肢酸削飲食不調結牢惡血不除月水不如時或在前或在後乍久不止因生積聚如懷胎狀邪氣盛甚令人恍惚多夢寒熱四肢不欲時動陰中生氣腫肉生風



甚者小便不利苦痛如淋狀面目黃黑歲月病即不復生子黃帝曰吾深所憂也療之奈何可得愈病令人有子願拜受非其人不故妄傳何以神良耳素女曰今詳面圖

一曰黃疸黃疸者婦人月水始下若新傷墜血氣未止卧寢未定五藏六腑虛羸精神不定因向大風便利陰陽開閉關節四達中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名為陰虛則生黃疸之聚令人病苦四肢寒熱身重淋露臥不欲食左脇下有氣結牢不可得抑苦病腰背相引痛月水不利則善令人不產少腹急下引陰中如刺不得小便或時寒熱下赤黃汁病苦如此令人無子療當刺關元氣衝行以毒藥有法療治瘕當下即愈矣

又療黃疸皂莢散之導方

皂莢炙去皮子蜀椒各一斤

細辛六分

右三味搗散以三角囊大如指長二寸貯之

取內陰中則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

二曰青瘕青瘕者婦人新生未滿十日起行以湯浣洗太蚤陰陽虛玉門四邊皆解散子戶未安定骨肉皆痛手臂不舉飲食未復內藏吸吸又當風臥不自隱障若居濕地及濕席令人苦寒洒洒入腹中心腹煩悶沈淖惡血不除結熱不得散則生青瘕之聚在左右脇下藏於背脊上與肩甲腰下攣急兩足腹下有氣起喜唾不可多食四肢不欲動搖恍惚善夢手足腫面目黃大小便難其候月水不通利或不復集狀如崩中此自過所致令人少子療之當刺胃管行以毒藥有法瘕當下即愈矣

又瘕青瘕導藥方

戎鹽一斤包莢半兩

細辛六分

右三味搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰

中但臥瘕當下青如葵汁養之如瘕法

三曰燥瘕燥瘕者婦人月水下惡血未盡其人虛憊而以夏月熱行疾步若舉重移輕汗出交流氣力未平而卒以志怒致腹中輾咽不泄經脈攣急內結不舒煩滿少力氣上達隔中背脊少腹墮急月水與氣俱不通利而反以飲清水快心月水橫流溢入他藏不去有熱則生燥瘕之聚大如半杯上下腹中苦痛在兩脇下上引心而煩害飲食食飲嘔吐胸及腹中不得太息腰背重喜臥盜汗足酸劑久立而痛小便

尚德按日  
疑當作月

尚德按日  
疑當作月

失時忽然自出若天積月水閉塞大便澀難有此病者令人少子療之以長針按而刺之法度行以毒藥  
瘕當下即愈矣

又瘕瘕瘕方 大黃如雞子許乾薑二兩雞胞脰中黃膜一枚黃連二兩桂心一兩廔蟲三枚厚朴十兩郁李仁一兩

有子三日勿合陰陽  
右八味搗散早朝空腹以溫酒一盞和三錢匕頓服瘕當下下畢養之如產婦法三月無子者當

四曰血瘕血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣盛溢入他藏若大肌寒吸吸不

可以俯仰橫脇下有積氣牢如石少腹裏急苦痛背脊疼腰股下痛陰裏苦生子風冷子門僻月水不時

乍來乍去有此病者令人無子療之瘕當下即愈矣

崔氏瘕婦人血瘕痛方 乾薑 烏賊魚骨各一兩桃仁一兩右三味搗散酒服二方寸匕日二

又方 取古鐵秤銕或大斧頭或鐵杵以炭火燒令赤投好酒三升中稍稍飲之

又方 桂米溫酒服方寸匕佳日二

古今錄驗瘕婦人血瘕攻刺腹脇時痛導藥方 大黃 當歸各半山茱萸一兩包莢一兩細辛 戎鹽

二六 右六味搗以香脂丸如指大每以綿更內陰中正坐良久瘕當下養如乳婦之法

五曰脂瘕脂瘕者婦人月水新下若生未滿三十日其人未復以合陰陽絡脈分胞門傷子戶失禁關節

散五藏六腑津液流行陰道動百脈關樞四解外不見其形子精與血氣相遇犯禁子精化不足成子

則生瘕瘕之聚令人支滿裏急痛痺引少腹重腰背如刺四肢不舉飲食不甘臥不安席左右走腹中切

痛時差時甚或時少氣頭眩身體疼解苦寒惡風膀胱脹月水乍來乍去不如常度大小便血不止有此

病者令人無子瘕之常刺以長針行以毒藥瘕當下即愈矣

又瘕脂瘕方 包莢八枚礬石二枚五味子 蜀椒 汗細辛 乾薑各半 右六味搗散以香脂和如

八瘕方十二



大豆黃男子陰頭以合陰陽不三行其處乃愈

又瘰癧人絕不復生及未曾生皆以脂癭腹中有塊以湯煎自下尚不受子導散方

包

炙子皮吳茱萸

卷之四

蜀椒  
二斤

雨  
細  
早  
穀

礬石燒

五味子

三  
天黃

戎鹽

乾薑

右

十味搗

散以輕絹袋

和指又長三寸盛鉢令滿內陰中坐臥隨意勿行走小便時去之別換新者

八月水當日數來而反悲哀自恐若以遠行逢暴風疾雨雷奮恐被濕罷音倦少

水不濟火，火不濟水，則陰陽相戾，精氣絕，精神滅亡，邪氣入於陰裏，不去則生孤癰之聚，食人子

子戶不受男精五藏氣盛令人嗜食欲

以壽樂有去復當下即愈矣

又療狐癧方 取新死鼠一枚裹以新絮

分去絮內桂心末六銖酒服二方寸匕病當下甚者不過再服差止

曰蛇藏蛇藏者婦人月水已下新止適閉未復胞門子戶勞動陰陽

為飲食未調若起行當風及度泥塗因衝寒大早若坐濕地名曰陰陽亂腹中虛若遠行道路伏飲污井

之水不潔之食通吞蛇鼠之精流落不去則生蛇癰之聚上食人之肝心若病長久條條在臍下上還絞

左右脇不得吐氣兩股脛間若疼少腹多熱小便赤黃膀胱引陰中攣急腰背俱痛難以動作喜發寒熱

少有此病者不復生子其痛手足成形者殺人未嘗可治之慮有法度行以毒藥服當下即

方黃  
上各半升  
大如指  
少者六十二  
大者六十二

者之三弟下校去亭下消適寒暄限之十日一宿空復限之畜下

白體病體者婦人月水新至其人劇作罷音勞于山衣服間鼠不以持去之台當風垂尾逐鼠也光

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

已覺怪跳立未安顏色未平復見所好心為開張總總或動五內脫消若入水沉洗沐浴不以時出而神  
不守水氣與邪氣俱入至三焦之中又暮出入至門先開津液妄行留落不去則生蠱瘕之聚大如小杯  
令人少腹內切痛惡氣左右走上下腹中苦痛若存若亡特之躍手下引陰裏腰背亦痛不可以息月水  
不通面目黃黑脫聲少氣有此病者令人絕子其瘕有手足成形者殺人未者可治之瘕有法度以長針  
按瘕之行以毒藥瘕當下即愈矣

又瘕蠱瘕方 大黃六分乾薑 側子各半附子 人參各九厚蟲一寸桂心六兩細辛 土鱉各十白朮

兩 右十味搗散以酒服方寸匕日三以上八服瘕疾古今錄驗第三十卷中

內瘕方二首

集驗瘕婦人臍下結堅大如杯并月經不通寒欲往來下痢蠱瘕此為瘕氣不可瘕未生瘕者可瘕方

生地黃三十斤乾漆一斤 右二味搗漆為散內地黃汁中微火煎令可丸酒服桐子大三丸至七八

丸即止

刪繁瘕女人子門不開血聚腹中生肉癰築築如物此呼為瘕氣藏寒所致生地黃煎破血丸方 生地

黃 生牛膝汁各乾漆一斤 右三味搗漆為散內地黃等汁中微火煎取堪為丸止停攪丸如梧

子一服三丸以酒服日再若覺腹內過痛食後乃服之

婦人崩中方一十一首

小品瘕婦人崩中晝夜十數行醫所不能瘕方 芎藭八兩 右一味切以酒五升煮取三升分三服不飲

酒水者亦得

千金瘕崩中方 白茅根一斤小薊根五斤 右二味切以酒五升煮取四升分稍稍服

又瘕婦人白崩中方 芎藭 阿膠炙桂心 赤石脂 小薊根各二乾地黃四兩伏龍肝七枚 右七

味切以酒六升水四升煮取三升去滓內膠令烊分為三服日三並此第四卷中

尚德按婦  
人二字疑

尚德按千  
金白茅根  
三斤以水  
五斗煮取  
四斗



千金翼療婦人白崩中馬通方 白馬通汁二乾地黃兩四伏龍肝如雞子桂心大七枚 芎藭 阿膠炙小薊根

白石脂兩二 右八味切以酒七升合馬通汁煮取三升去滓內膠令烊分服日三

又療婦人崩中及痢一日一夜數十起大命欲死多取諸根煎凡得入腹即活若諸根難悉得者第一取

蓄藏根令多多仍合之遇有酒以酒服無酒以飲服其種種根當得二斛為佳蓄藏根煎方 懸鉤根

蓄藏根 柿根 菰葉解各一 右四味剉合釜中以水淹使上餘四五寸水煮使三分減一去滓無大

釜稍煮如初法都畢會汁煎取一丸丸如梧桐子酒服十丸日三良並出第八卷中

又仲療婦人崩中漏下去青黃赤白使人無子方 禹餘糧研 赤石脂研 牡蠣研 桂心 烏賊魚骨 蠶

下黃土各等分 右六味為散以清酒服方寸匕日二服忌生葱

又方 鹿茸炙當歸兩二蒲黃兩二 右三味搗散酒服五分匕日三度

又方 取好書墨為末二匕若燒露蜂房末三指撮酒服之

又方 常炙猪腎食之並出第九卷中

必效療崩中方 丁香一百斤 好酒一大 右二味煮取三兩沸去滓頓服

又療婦人崩中無久近悉主之方 伏龍肝一斤見於盆中以水二斗用者諸藥小薊根桑寄生續斷

地榆 艾葉各三兩 阿膠 當歸 赤石脂厚朴二兩 生薑兩五 右十味切以伏龍肝水煮取三升絞

去滓分三服常法

崩中去血方一十三首

廣濟療崩中去血日數升方 龍骨研 赤石脂研 各五分 鮫魚骨 牡蠣粉 肉蓯蓉各五兩 龜甲炙 芍藥

續斷各八 右八味搗散飲服方寸匕日三漸加之加乾地黃十分佳

又療崩中下血不止并主男子卒痢血方 取東南引挑枝三握細剉以水四升煮取一升頓服未差更

服良

刪繁療婦人崩中泄血不斷淋瀝連年不絕黃廐傷損芍藥散方 芍藥四兩 牡蠣一枚 乾地黄 白朮 乾

薑 烏賊魚骨 附子炮 桂心 黃耆 龍骨各八分 右十味搗散酒服方寸匕良

小品療崩中去血方 春生薊根汁一升溫服之亦可以酒煮隨意用之

又療婦人暴崩中去血不愈方 牡蠣數合 兔骨又各十分 右二味搗歸為散以酒服方寸匕妙

集驗療婦人女子忽暴崩中血不斷或如鵝鴨肝者方 小薊根六兩 阿膠炙 當歸 芍藥 續斷 青竹

茹各三兩 竈中黃土 地榆根各四兩 生地黄八兩 赤馬通一斤 右十味切以水八升合馬通汁煮取二升

半分為三服未全止服三四劑後服此丸方 續斷 甘草 鹿茸 小薊根 丹參各五兩 乾地黄十分

芍藥 阿膠炙 赤石脂 當歸 地榆各六兩 柏葉四分 秦牛角炙 龜甲各十二分 右十四味搗篩

蜜丸如桐子以酒服十九日再加之至三十丸忌如常法千金

千金療婦人崩中去血積時不止起死方 肥羊肉三斤 乾薑 當歸各三兩 生地黄汁二升 右四味切

以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黄汁合藥煮取三升分為四服尤宜羸瘦之人服妙

又療崩中去血產後餘疾丹參酒方 艾 生地黄 地榆 丹參 忍冬各五斤 右五味合搗之以水

漬三宿去滓煮取汁以糯米一石釀酒飲服之

又溫經湯療崩中去血一斗服之即斷月水過期不來者服之亦佳方 吳茱萸三兩 麥門冬去心 半夏兩

當歸 芍藥 人參 芍藥 牡丹 桂心 阿膠炙 生薑 甘草各二兩 右十二味切以水一斗煮

取三升分服忌如常法並出第

千金翼療婦人崩中去血不止薊根酒方 大小薊根各一斤酒一斗漬五宿任意多少服之良

又療婦人崩中下血擇柳葉湯方 柳葉三束 門冬去心 乾薑各二兩 甘草一兩 乾棗十枚 右五味切以水

一斗煮柳葉取八升去滓內藥煮取三升分三服日三並出第

救急療崩中下血數斗氣欲絕方 伏龍肝五斤 人參 麝香兩 生薑四兩 右四味切以水一大斗煮取二

尚德按  
疑當作  
赤石脂

尚德按  
金肥羊  
黃汁三升

尚德按  
金燕方  
斗作斛  
水下有  
通多及  
字當歸  
兩分三  
服要略  
溫經湯  
夏半升  
尚德按  
金翼以



二斗漬

尚德按肉  
斤穿千金  
並作升

尚德按千  
全日二

尚德按千  
金燒酒  
骨毛皮骨  
為末以酒  
服方寸匕

尚德按千  
金一升作  
一斗三升  
作二升  
尚德按千  
金久字下  
有產字澤  
蘭三兩六  
錢有鍾乳

帶下方一十首

升下藥煎取一升半更別研伏龍肝一雞子許并香內湯中攪令調分服

廣濟療帶下方 芍藥七大兩熬令黃黑為散以酒服三錢匕

千金療帶下方 狗祀根斤一生地黃斤五 右二味切以酒一斗煮取五升分為三服

又方 燒牛角末酒服方寸匕日三

又方 桑耳燒令黑酒服方寸匕日三

又方 豉酒亦佳尚德按千金與此方云服大豆紫湯日三服服是方見千金第四卷中風篇中

又方 燒馬左蹄末酒服方寸匕日三

又方 燒狗頭骨灰亦佳

又方 以水煮甄帶汁服之亦佳並出第四卷中

救急療帶下方 以蠶下黃土水和為泥作彈子丸百枚暴乾以火燒熱熨以三年酢漬一丸綿裏內玉

門中唯深待冷即易之新患者三十丸差久者五十丸餘皆自知即佳

必效療婦人帶下方 取兔皮燒令烟斷為末酒服方寸匕妙

婦人虛羸月病不能食方三首

千金療婦人虛羸短氣胸脇逆滿風氣石斛生地黄煎方 石斛 甘草炙 紫苑各四 桂心二 生地黃汁

酒升各八 茯苓斤一 大黃兩八 麥門冬二升 桃仁半升 去去 右十味搗末合盛銅器中加炭火內鹿角膠一

斤數攪之得一升水內飴三斤白蜜三升合和調更於銅器中盛湯上煎攪之以生竹抄與令著器攪

令盡相得藥成先食酒服如彈丸日一服

又鍾乳澤蘭丸主婦人久羸瘦四肢百體煩疼臍下結冷不能食面目瘵黑憂恚百病悉主之方 澤蘭

分九 芍藥 甘草炙 山茱萸 白芷 牛膝 當歸 薯蕷 薯本各五 柏子仁 人參 乾地黄 又

三雨防風  
四十二  
其二十二  
味

尚德按婦  
人二字疑  
尚德按千  
金當歸甘  
草各一兩  
藥各一兩  
夜二  
尚德按千  
金肥猪肉  
十斤無三  
石二字令  
作冷  
尚德按甘  
下同霜濕  
散蓋下方  
六味者是  
前以云在  
本當言之  
耳外臺第  
二十五卷  
尚德按并  
疑當作并

門冬去心石膏石斛分六細辛桂心分四燕髮分二艾葉分三右十九味搗篩蜜和丸如桐子大服二

十丸加四十九酒下忌如常法並出第

救急療婦人月病不調或一月不來或隔月不來或多或少或少臍絞痛面色痿黃四體虛吸藏瘦不能食方

當歸牛膝桃仁去皮壯丹皮大黃別處各芍藥土瓜根芍藥朴硝桂心各二蠶蟲去

足水蛭半兩右十二味切以水九升煮取三升分溫服忌如常法

婦人陰蝕及瘡方八首

千金療陰蝕瘡方當歸地榆甘草芍藥芍藥右五味切以水五升煮取二升洗之日

三夜一

又方蒲黃水銀右二味研之以粉工

又方肥猪肉三十斤以水三石煮取熟去肉入盆中浸之令即易不過三二度並出第

崔氏療陰蝕洗搗湯方甘草乾漆黃芩乾地黄芍藥當歸龜甲右七味切

以水七升煮取半去滓以綿帛內湯中以搗瘡處良久即易日二度每搗湯可行十里許即裏乾捻取

甘濕散薄付瘡上使過可經半日又以湯搗搗訖如前傳藥其內甘濕散是蟬蛇膽等六味者是在前

療甘濕卷中余家婢遇此疾百方療不差蝕處作兩瘡深半寸余於涓子方中檢得此甘草湯方仍以

自處蟬蛇膽散用不經七日瘡乃平復甚效丸救十八人手下即活過斯疾者請廣流布傳之出第十

又按丸疑

又療瘡頻用大效方蟬蛇膽青木香石硫黃鐵精麝香舊用五月五日蝦蟆時分

先以少入用緣麝香研訖右六味等分搗篩為散更細研有患取如三菴子和并花水日再服服

訖先令便利了即以後方桃枝重下部訖然後取散如二菴子內竹管裏深吹入下部中亦日再老小

量減其重法每日一度不用再為之甚良



尚德按之  
字下疑脫  
方字

又瘰癧蟲食下部及五臟方 取桃東南枝三七枚輕打頭使散以綿反纏之又搗石硫黃為末將此綿

纏桃枝攪轉之令未少厚又截一短竹筒先內下部中仍以所搗藥桃枝熟灰重之並出第  
三卷中

文仲療陰蝕欲盡者方 蛆蟻兔屎等分末傅之良

古今錄驗瘰癧婦人陰蝕苦中爛傷狼牙湯方 狼牙三兩咬咀以水四升者取半升去滓內苦酒如雞子

中黃一杯煎沸適寒溫以綿濡湯以漉瘡中日四五度即愈

### 陰中腫痛方四首

肘後療陰中腫痛方 災積實以熨之

經心錄療婦人陰中腫痛不可近者湯洗方 防風三兩 大戟二兩 艾五兩 右三味切以水一斗煮取五升溫

洗陰中日可三度良

古今錄驗瘰癧婦人陰腫堅痛礬石散方 礬石二分 甘草半分 大黃一分 右三味搗篩取棗大綿纏導陰

### 中二十日即愈

又瘰癧婦人陰腫苦瘡爛麻黃湯洗之 麻黃去節 黃連 蛇牀子各一兩 酢梅十枚 右四味切以水一斗煎取

五升洗之

### 陰中瘡方五首

集驗療婦人陰中痛生瘡方 羊脂一斤 當歸 杏仁去皮 白芷 芎藭各一兩 右五味細切羊脂和置甑

中蒸之藥成取如大豆一枚綿裹藥內陰中日一度

肘後瘰癧女子陰中瘡方 末硫黃傅瘡上

又瘰癧女子陰中瘡方 杏仁去皮 雄黃 礬石各二分 麝香半分 右四味和博之日三度

古今錄驗瘰癧婦人陰中生瘡黃芩湯洗方 當歸 黃芩 芎藭 大黃 礬石各二分 黃連一分 雄黃一分

右七味切以水五升者取四升洗瘡日三度

尚德按水  
銀粉謂之  
噴粉  
又據羅  
當作羅

尚德按千  
金治瘡中  
聚有蟲與  
前瘡陰蝕  
瘡方通用  
不則出此  
方

尚德按肉  
疑當作肉

又療婦人陰中生瘡銀黃散方 苦節 黃連 檳榔 黃芩 丹砂 蜀椒 細辛 當歸各一 右七味

陰痒方五首

廣濟康苦虎門痒無計方 蜈蚣 蛇胆 雄黃 石硫黃 硃砂 硝粉 木藜蘆 蕪荑各二 右七味

細篩重羅令調以臘月猪脂和如泥取故布作屢子如人指長一寸半以藥塗上內孔中日一易易時

宜以猪椒根三兩著湯洗乾拭內藥佳

崔氏療陰痒痛不可忍方 取蒜隨多少煮作湯洗之日三

又方 取狼牙蛇牀子煮作湯洗日三

又方 取杏仁燒作灰乘熱罽裏內陰中良 並出第 十卷中

經心錄療陰痒方 枸杞根一斤水三斤著十沸通寒溫洗之

千金療人陰蟲瘡方 又按人 以肥猪肉一斤以水煮肉令爛去肉以湯令極熱使灌瘡上冷易之

又方 取狼牙兩把以水五升煮取一升洗之日五六度 並出第 三卷中

崔氏療陰痒似有蟲狀煩悶直止散方 真丹 硃石 二 芍藥 右三味為散以穀囊盛著陰中

蟲當兒盡

又陰痒有蟲方 取雞肝去脂及熱內陰中蟲當盡死 並出第 十卷中

古今錄驗療陰痒有蟲方 取牛肝截五寸繩頭內陰中半日蟲入斷出之猪肝亦得

又療陰中有蟲痒且痛目腫鼻黃欲得男子漏血下白少氣思美食方 用生鯉魚長一尺去頭內取骨

搗末敷黃黑以猪脂和以蠟蜜盛如常法內陰中至痛處即止

陰下脫方四首

陰下脫方五首 陰下年有蟲方 陰下年有蟲方 陰下年有蟲方



廣濟療陰下脫出方包文子去皮半夏大黃細辛各四蛇牀子右五味搗散薄絹袋盛如指大

內陰中日二易又以羊脂煎煮過上以鐵精傳脂上多少令調以火炙布令暖以熨之研礞石酒服

方寸匕日三服  
集驗療婦人陰下脫散方當歸 黃芩 牡蠣各二兩 獨皮各一兩右五味搗服散酒方寸匕

日三服禁舉重良千金

千金療陰下脫硫黃散方硫黃研 烏賊魚骨各二五味子右三味搗散以粉上日三

千金翼療諸婦人陰下脫方細研礞石酒服方寸匕日三服出第六卷中

陰挺出方三首

廣濟療婦人子藏挺出數痛洗方蛇牀子一酢梅右二味以水五升煮取二升半洗痛處日夜

十過良

又方烏頭炮 白芨各四右二味搗散取方寸匕以綿裹內陰中令入三寸腹內熱即止日一度著明

晨仍須更著以止為度

集驗療婦人陰下挺出方蜀椒 烏頭 白芨各二右三味搗篩以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹

中熱明旦更著差止千金

女人傷丈夫頭痛方二首

集驗療女人傷於丈夫四體沉重噓吸頭痛方生地黃 芍藥 香豉 升 葱白 生薑 甘草右

右六味切以水七升煮取二升半分三服不得重作慎房事千金

千金翼療諸婦人傷丈夫若頭痛欲嘔悶暴白皮湯方桑根白皮 乾薑 桂心 大棗右

四味切以酒一斗煮三四沸去滓分溫服之通衣無令汗出千金同出第八卷中又挾

交長軌血出痛方二首

尚德按得  
千金作療  
尚德按千  
金翼若作  
若喉字下  
有心字下  
全同乾薑  
一藥以水

二大升煮  
取八合分  
二服千金  
以水一斗  
煮取三升  
去滓分三  
服

尚德按斷  
崩虛以塗  
之千金作

研胡麻以  
傅之

尚德按千  
金桂心六  
銖

尚德按千  
金薑大黃  
三分

尚德按法  
疑當作方

千金療女人交接輒血出方 桂心 伏龍肝各二 右二味搗末以酒服方寸匕差止出第三卷中  
崔氏療合陰陽輒痛不可忍方 黃連六分 牛膝四分 甘草四分 右三味切以水四升煮取二升洗之日三

四度差止出第十卷中

童女交接他物傷方三首

集驗療童女交接陽道遠理及他物所傷犯血出流離不止方 取釜底墨斷葫蘆以塗之

又療童女交接陽道遠理血出不止方 燒髮并青布末為粉塗之

又方 割雞冠取血塗之

小戶嫁痛方四首

千金療小戶嫁痛連日方 甘草三分 芍藥二分 生薑三分 桂心 右四味切以酒二升煮取三沸去滓分

溫服之神良出第三卷中

千金翼療小戶嫁痛單行方 牛膝五兩 右一味切以酒三升煮再沸分三服

又療婦人嫁痛單行大黃湯方 大黃三兩 右一味以酒一升煮一沸頓服

又療婦人小戶嫁痛烏賊魚骨散方 烏賊魚骨二枚燒為屑酒服方寸匕日三出第三卷中

坐藥方三首

通真論療婦人子門冷坐藥法 蛇床子二兩 茱萸六分 麝香二銖 右三味搗散蜜丸綿裹如酸棗內之下惡

物為度

近效坐藥主下冷子門痺閉方 吳茱萸 葶藶子各二分 蛇床子三分 無食子一枚 右四味為散以綿裹如

囊許內子宮中令熱為度

又方 遠志二兩 蛇床子 五味子各四分 乾薑 蓮花葉各三 右五味搗散以口中玉泉和兔矢大內陰

門中去冷內熱良夏候



婦人欲斷產方四首

小品斷產方

故布方圓一尺燒屑以酒飲服之終身不產

千金云點

又療妊身欲去之并斷產方

梧葉

桂心

各三升

右三味切以水四升煮取一升半分服之

又方

附子二枚搗為屑以瀉苦酒和塗右足去之大良

千金斷產方

油煎水銀一日勿息空肚服棗大一丸永斷不損人

尚連服十  
會用此方  
後氏

唐王壽先生外臺祕要方卷三十五目錄小兒諸疾上

尚德按令  
有法一十  
八首

尚德按八  
疑當作九

尚德按法  
疑當作方

尚德按環  
疑當作環

尚德按衣  
字下疑脫  
案字

尚德按法  
方之方字  
疑衍

尚德按停  
疑當作時

小兒方序例論一首

小兒初生將護法一十七首

小兒初生將息法二首

小兒初受氣論一首

小兒變蒸方二首

相兒命長短法並論二十八首

小兒藏衣法五首

浴兒法一十一首

剝兒頭法一首

哺兒法三首

攘謝法一十二首

揀乳母法一首

小兒驚癇啼壯熱不喫嘔吐不已不小便方五首

小兒將息衣厚薄致生諸癇及諸疾方並灸法二十八首

小兒驚悸方二首

小兒夜啼方一十首

小兒驚夜啼方七首

小兒客忤方一十首

小兒癰疽癰方六首

小兒痰結方二首

小兒因食痞滿羸瘦不下食肚脹方四首

小兒食不下及不消不嗜食方四首

小兒霍亂方一十二首

小兒霍亂雜療方六首

小兒吐痢方四首

小兒噤方二首

小兒口噤方四首

小兒重舌方並灸法方十三首

小兒鵝口驚口方六首

小兒口瘡方五首

小兒口中涎出方三首

小兒舌上瘡唇腫方五首

小兒咽喉生瘡方二首

小兒喉痹方四首

小兒停耳方四首

小兒鼻塞方四首



夕  
臺  
和  
平  
一  
丁

唐王壽先方外書校勘方卷三十五

宋劉敬夫方外書校勘方卷三十五

新安後學程道通父訂梓

小兒方序例論一首

千金論曰夫生民之道莫不以養小為大若無小卒不成大故易稱積小以成高大詩有厥初生民傳云  
聲子生門公此之一義即是從微至著自少及長人皆共見不待經史故今斯方先婦人小兒後丈夫者  
老者則是崇本之義也小兒氣勢微弱醫人欲留心最療立功差難今之學者多不存意良由嬰兒在於  
襁褓之內乳氣腫脹醫者操行英雄詎肯瞻視靜而言之可為大慮者矣小品方云凡人年六歲以上為  
小十六以上為少三十以上為壯五十以上為老其六歲以下經所不載所以乳下嬰兒有病難療者皆  
為無所承據也中古有巫妨者立小兒顛顛經以占大書判疾病死生世相傳授始有小兒方焉逮于晉  
宋江左推諸蘇家傳習有驗流於人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位  
望隆重何暇留心於少小詳其方意不甚深細小有可採未為至秘今博採諸家及自經用有效者為上  
下兩卷可披而尋之凡百居家皆宜達茲養小之術則無夭橫之禍也

小兒初生將護法一十七首

卷中五

崔氏療小兒初生便以綿束指拭口中及舌上青泥惡血此為之玉術一作若不急拭啼聲一發即入腹  
成百病矣

又療兒生落地不作聲方 取煖水一器灌之須臾自當啼

又兒生不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶向身却持之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發

又方 以葱白塗徐難之即啼

又方 小兒初生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴乃先浴之然後速斷臍不得以刀子割之須

外書必

卷三十五

小兒初生將護法一十七首



尚德按  
字下千金  
有筋頭二

令人隔單衣物以斷兼將暖氣呵七遍其後纏結所留臍帶當令長至兒足跌上短即中寒今兒腹中  
不調常下痢若先斷臍其後浴者則臍中水中水則發腹痛其臍斷訖連臍帶中若有蟲宜急剔撥去  
之不爾當入兒腹成疾矣

又兒中水及中冷則令兒腹中絞痛天乳啼呼面青黑此是中水之過兒尿清一云黃者冷也與兒臍中水  
即同方當艾粉絮熨之不時治護臍至腫者當臍中隨輕重重者便灸之乃可至八九十壯若輕者臍

不大腫但出汁時時啼呼者但擠當歸末和胡粉敷之仍灸絮日日熨之至百日乃愈以啼呼止為候

又兒初生法宜用父故衣裏之若生女宜以母故衣勿用新帛切須依之令兒長壽

又一時之內兒衣皆須用故綿帛為之善兒衣綿帛持忌厚熱慎之慎之

又兒洗浴斷臍訖棚抱畢未可與朱蜜宜與甘草湯取甘草可中指一節槌碎以水二合煎取一合以綿  
纏沾取與兒吮之可得一蠅殼入腹止兒當快吐吐去心胸中惡汁也如得吐餘藥更不須與若不得  
吐可消息計如饑渴須更復與之若前所服及更與並不得吐者但稍稍與之令盡此一合止得吐去  
惡汁令兒心神智慧無病也吮一合盡都不吐者是兒不食惡血耳勿復與之乃可與朱蜜以鎮心神  
安魂魄也

又小兒初生三日中須與朱蜜只不宜多多則令兒脾胃冷腹脹喜陰痢氣急發瘰疰而死也與朱蜜法  
以真經飛煉末如大豆以赤蜜一蠅殼和之以綿纏沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可  
三日與之則用三豆許也亦勿過過此則傷兒與朱蜜訖可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱  
定精神止驚辟惡氣除小兒百病三日後應開腸胃助穀神可研米作厚飲如乳酪厚薄以大豆粒多  
與嚼之嚼三豆許止日三與之滿七日乃可與嚼也

又兒生十日始哺如粟核二十日倍之五十日如彈丸百日如棗若乳汁少不得依此法當用意少少增  
之若至二十日而哺者令兒無病兒若早哺之及多者令兒頭面身體喜生瘡愈而復發令兒羸弱難

尚德按筋  
千金作筋  
下同

長乳兒不用太飽飽則令吐候兒吐者乳太飽也當以空乳乳之即消夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令兒欬痢乳母哺兒當先以手按散其熱氣勿令乳汁奔出以令兒噎如噎即便奪其乳令得氣息定復乳之如是十反五反視兒饑飽以節度之一日之中幾乳而足以為常準又常捉去宿乳也乳母與兒卧當以臂與兒枕之使乳與兒頭平乃可乳之令兒不噎母欲睡即奪去其乳勿令填兒鼻口乳不知饑飽忌之

又兒初生著口噤不開不收乳方 赤足蜈蚣半枚去足炙令焦末研之絹篩以猪乳二合和之分三四服與之差

又兒著口噤體熱者方 暖竹瀝二合分四五服之

又兒初生不可逆灸之忍痛動其五脉因喜成癩是以田舍小兒任其自然皆無此天也

又兒初生有鵝口者其舌上有白屑如米刺者鼻外亦有瘡之法 以髮纏筋頭沾井花水擦拭之三旦如此便去不者可煮粟莢汁令濃以綿纏筋頭沾拭之無粟莢煮粟未皮如井花水法千金同並出第十上卷中

又仲療兒生有連舌舌下有膜如石榴子中隔連其舌下漸漸喜令兒聲不發不轉法 以瓜槓斷之微有血出無害若血出不止可燒髮作末以敷之即止千金

又兒初生六七日後血氣收斂成肉則口舌喉頭裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆薹或水狀者若懸癰

有脹起者以綿纏長針留刃處如粟米許大以刺法之令氣洩去青黃赤血汁也一刺之止消息一日若不消又刺之不過三刺自消或餘小小未消三刺之亦止自然消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏

及上腭如此者名重腭有著齒斷上者名重舌斷皆刺之去血汁差止千金

又療兒初生出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血阻一作敗不成肌肉則使面目

鼻口左右悉黃而啼一作不開目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脈不斂也喜不育如此者

宜與龍膽湯方在客忤部中十味者是也千金



尚德按兒  
字上脫脫  
小字  
尚德按又  
字以下疑  
當列揭為  
一條

尚德按千  
金如作和  
百五十日  
百脈生作  
成尚作立

尚德按又  
基千金作  
大基  
論院藏之  
候尤詳

小兒初生將息法二首

千金兒初生不可令衣過厚熱令兒傷皮膚害血脈發雜瘡而黃又小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易中傷皆當以故絮衣之勿用新綿也天和暖無風之時令母將於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏於幃帳之中重衣溫暖譬猶陰地之草木不見風日乾脆不堪風寒也

出第五卷中

小兒初受氣論一首

崔氏論曰凡小兒初受氣在娠一月結胚二月作胎三月有血脈四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月百神能備而生矣生後六十日曰腫子成始笑應知人百五十日百脈生能反覆百八十日尻骨成能獨坐二百一十日掌骨成能匍匐三百日髓骨成能獨倚三百六十日為一期膝骨成乃能行此其定法若有不依期者必有不平之處

小兒變蒸論二首

崔氏小兒生三十二日一變六十四日再變兼蒸九十六日三變百二十八日四變又蒸百六十日五變百九十二日六變又蒸二百二十四日七變二百五十六日八變又蒸二百八十八日九變三百二十日十變又蒸此小變蒸畢也後六十四日又一大蒸蒸後百二十八日又一大蒸此大蒸都畢也凡五百七十六日乃成人所以變蒸者皆是榮其血脈改其五臟故一變畢輒覺情態忽有異也其變蒸之候令身熱脈亂汗出目睛不明微似欲驚不乳哺上唇頭小白泡起如珠子耳冷尻亦冷此其診也單變小微兼蒸小劇先期四五日便發發後亦四五日歇凡蒸平者五日而衰遠至七日九日而衰當變蒸之時慎不可療及灸刺但和視之若良久熱不已可微與紫丸熱歇便止若於變蒸中加以天行溫病或非變蒸而得天行者其診皆相似唯耳及尻通熱口上無白泡耳當先服黑散以發其汗汗出溫粉粉之熱當歇便就差若猶不都除乃與紫丸下之其間節度甚多恐悠悠不能備行今略疏其經

要者如此

又黑散方

麻黃一分 大黃一分 杏仁二分 去尖

右三味先搗麻黃大黃為散杏仁別搗如脂乃細細

內散又搗令調和訖內密器中一月兒服如小豆大一枚以乳汁和服之抱令得汗汗出溫粉粉之勿

使見風百日兒服如棗核以兒大小量之為度

又紫丸方

代赭 赤石脂各一斤 巴豆三十粒 杏仁五十粒 去尖

右四味搗代赭等二味為末巴豆杏

仁別搗如膏又內二味合搗三千杵自相和若硬入少蜜更搗密器中密封之三十日兒服如麻子一

丸與少乳汁令下喉食頃後與少乳勿令多至日中當下熱除若未全除明旦更與一丸百日兒服

如小豆一丸以此連量增減也小兒夏月多熱喜令發疹二三十日輒一服甚佳此丸無所不治代赭

須真者若不真以左顧牡蠣代之忌猪肉蘆薈並出第十卷中

相兒命長短法並論二十九首

千金翼兒生乳骨不成者能言而死 膝骨不成者能偃而死 掌骨不成者能齧齧而死 踵骨不成

者能行而死 膈骨不成者能立而死 身肉不收者死 魚口者死 腰間無生肉者死 頤下破者

死 陰不起者死 囊下白者死赤者死

相法甚博略述十數條而已

兒初生陰大而與身色同者成人 兒初生額上有旋毛早貴妨父母 兒初生叫聲連延相屬者壽聲

絕而復揚急者不壽 兒初生汗血者多厄不壽 兒初生目視不正數動者大非佳人 兒初生自開

目者不成人 兒初生通身軟弱如無骨者不成人 兒初生髮稀少者不聽人 兒初生臍小者不壽

兒初生早坐早行早語早齒生惡性者非佳人 兒初生頭四破者不成人 兒初生頭毛不周匝者

不成人 啼聲散不成人 啼聲深不成人 汗不流不成人 小便凝如脂膏不成人 常搖手足者

不成人無此伏候者皆成人

尚德按身肉千金翼作生身

尚德按千金翼不聽上有強字是注者作皆惡性



兒初生臍中無血者好即下經通遠者壽鮮白長大者壽論曰兒三歲以上十歲以下觀其性氣高下即可知其夭壽兒小時識悟通敏過人者多夭則項橐頰回之流是也小兒骨法成就感儀迴轉遲舒稍費人精神彫琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦夭則楊修孔融之徒是也由此觀之夭壽大略可知也亦由梅花早發不難成寒甘菊晚榮終於年事是晚成就者壽之兆也並出第十卷中

### 小兒藏衣法五首

崔氏凡藏兒衣法 兒衣先以清水洗之勿令沙土草污又以清酒洗之仍內錢一文在衣中盛於新瓶內以青綿裹之其瓶口上仍密蓋頭且置便宜處待滿三日然後依月吉地向陽高燥之處入地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸惟須牢築令兒長壽有智慧若藏衣不謹為猪狗所食者令兒癲狂蟲蟻食者令兒病惡若犬鳥食之令兒兵死近社廟傍者令兒見鬼近深水汚池令兒溺死近故窰傍令兒驚湯近井傍者令兒病聾盲棄道路街巷者令兒絕嗣無子當門戶者令兒聾不出耳聾著水流下者令兒青盲棄於大窰者令兒生癰瘡著林木頭者令兒自絞死如此之忌皆須慎之

### 又安產婦及藏衣天德月空法

正月

天德在丁  
月空在壬

二月

天德在坤  
月空在甲辰

三月

天德在壬  
月空在丙午

四月

天德在甲  
月空在甲辰

五月

天德在丙  
月空在丙午

六月

天德在甲辰  
月空在甲辰

七月

天德在丙午  
月空在丙午

八月

天德在甲辰  
月空在甲辰

九月

天德在丙午  
月空在丙午

十月

天德在甲辰  
月空在甲辰

十一月

天德在丙午  
月空在丙午

十二月

天德在甲辰  
月空在甲辰

凡藏兒衣皆依此法天德月空處埋之若有遇反支者宜以衣內新紙盛密封塞口掛於宅外福德之上向陽高燥之處待過月然後依法埋藏之大吉

又法 甲寅前日十日不得藏埋兒衣以瓶盛密封安置空處度十日即藏埋之

又法 甲辰乙巳丙午丁未戊申此五日亦不藏兒衣還盛瓶中密塞勿令氣通挂著兒生處過此五日

即埋之亦不得更過此日

尚德按法  
發富作方

又法 甲乙日生兒丙丁日藏衣吉丙丁日生兒戊己日藏衣吉戊己日生兒庚辛日藏衣吉庚辛日生

兒壬癸日藏衣吉並出第十上卷中

浴兒法一十一首

崔氏初生浴兒良日此謂初生浴兒以後重浴亦吉寅卯酉日大吉壬午丁未癸巳日凶

又浴兒虎頭骨湯主辟除惡氣兼令兒不驚不患諸瘡疥方 虎頭骨兩五 苦參兩四 白芷兩三 右三味切以

水一斗煮為湯內猪膽汁少許適寒溫以浴兒良

又療兒若卒客忤中人吐下不乳哺面青黃色變強急者以浴之方 取錢七十文以水三斗煮令有味

適寒溫浴兒良

又療兒生三日浴除瘡方 桃根 李根 梅根各八兩 右三味切以意著水多少煮令三四沸以浴兒

又療少小卒寒熱不佳不能服藥六物莽草湯浴兒方 莽草 丹參 蛇牀子 桂心各三兩 蒲蒲半斤 雷

丸斤 右六味以咀以水三斗煮五三沸適寒溫浴兒避日向陰處

又療少小身熱一物李葉湯方 李葉無多少以水煮去滓以浴兒良忌準前

又方 白芷煎湯浴兒佳根苗皆得

又方 苦參湯浴兒良

又凡尋常浴兒不錄別療諸病只就浴者方 湯熱添少許清澁水一檢鹽浴兒浴訖以粉摩兒既不畏

風又引散諸氣

又兒不用數浴數浴多背冷令兒發癩其湯必適寒溫得所

又療少小壯熱不能服藥宜此十二物寒水石粉散方 寒水石 芒硝 滑石 石膏 赤石脂 青

木香 甘草又 大黃 黃芩 芎藭 麻黃去 牡蠣熬 右藥各等分搗篩以粉一升和藥屑三合復

下篩以粉粉兒日三熱退即止本方有防風無牡蠣



又少小盛汗三物黃連粉方 黃連 牡蠣 貝母 右藥各等分搗篩以粉粉兒良

刺兒頭法一首

崔氏初刺兒頭良日寅丑日吉丁未日凶

哺兒法三首

崔氏初哺兒良日以平定成日大吉其哺不得令鹹

又方 寅丑辰巳酉日良

又方 男戌己日不得女丙丁日不得

振謝法一十二首

崔氏軒轅者乾神太陰使者可服藥六寸理生處大吉

雷公者震神太陰使者可服藥六寸理生處大吉

咸池者艮神天之東明使者天僕也害氣犯之令兒乍寒乍熱天

豐隆者艮神天之東明使者天僕也害氣犯之令兒乍寒乍熱天

招搖者坤神天上使者犯之令兒即愈

天候者艮神天上使者犯之令兒腹脹

吳時者艮神天上使者犯之令兒驚悸腹痛用馬補五

大時者兌神小北使者犯之令兒腹脹下利解之

犯月殺者血於生處謝之吉

犯白虎者生處謝之吉

犯大夫者謝之吉

犯日遊者令兒口燥色變欲死者用三

通按相一作也 內按按方設當作法下同

通接給也  
通接給也  
此乳也  
乳也

尚德後遂  
作遂後遂  
作遂後遂

揀乳母法一首

崔氏乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉血氣所生其乳兒者皆須性情和善形色不惡相貌稍通者若求全備不可得也但取不孤臭癰瘰氣嗽癰疥癰瘰白禿癰瘰瀰耳聾癰鼻癰癰無此等疾者便可飲兒師見其身上舊癰即知其先有所疾切須慎耳

小兒驚癰啼壯熱不喫癰吐不已不小便方五首

劉氏療小兒眠睡不安驚啼不喫癰虎睛丸方

小兒熱甚神效

犀角分十一子分五荖分五梔子仁分五大黃分十虎睛分一

研分一

丸服之漸增以差為度小兒百日以下小內壯熱以癰汁研四九與服即差

又療小兒初生不喫癰方

以乳兩合葱白一寸和前一兩沸去葱與喫即能喫乳立效以蛤蚧灌之

尚德

按補疑當作哺側見第二十八卷中

又療小兒喫癰不穩三日

至七日以來覺壯熱顏色赤及鼻孔黃即恐作撮口及孩子牙關裏有蟲似蝸

牛亦似黃頭白蚌螺者方

燒竹取漚半合和少許牛黃與喫即差又似猪肉拭口即引蟲出或自消便

差

又療小兒初生吐不止方

人乳二蓬陰分少腹兩米大

右三味煎三兩沸牛黃兩米許研和與服即差

止

又小兒初生不小便方

人乳四葱白寸

右二味相和煎分為四服即小便利神效

小兒將息衣囊厚薄致生諸癰及諸疾方並灸法二十八首

廣濟療小兒驚癰體羸不建療子母五癰煎方

釣藤分二知母分二子荖分四甘草分三升麻分三沙參分三寒

水石分六蛇蟬分一蛇蛻分三蛇蛻分三右九味搗篩以好蜜和薄泔著銅鉢於沸湯上調之攪不停手如飴

糖煎成稍稠別出少許一日兒嗽之一枚藥後大日夜五六過服不妨五六日兒嗽之三枚一百日兒



噉四枝二百日兒至三百日兒噉五枝三歲兒噉七枝以意量之

小品云玄中記曰天下有女鳥一名姑獲又名釣星鬼也喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里喚得來也是鳥純雖無雄不產喜落毛羽於中庭置入兒衣中便使兒作癩必死即化為其兒也是以小兒生至十歲衣裳不可露七八月尤忌之

嗽四枚二百日兒至三百日兒嗽五枚三歲兒嗽七枚以意量之

小兒疳積及諸症方并灸法十八首

五

千金夫癰病小兒之惡病也。或有不<sub>足</sub>求醫而致困者。然氣發於內。必先有候。常宜察審其精神而採其候也。手白肉魚際脈黑者。是癰候。魚際脈赤者。熱脈。青大者寒。青細者為平也。

又鼻口乾燥。小兒眼<sub>下</sub>是癰病。又鼻陽不明。上視。又耳<sub>後</sub>完骨上有刺<sub>骨</sub>或<sub>骨</sub>出<sub>骨</sub>不<sub>骨</sub>靜。又小兒<sub>鼻</sub>逆<sub>上</sub>啼<sub>哭</sub>向<sub>鼻</sub>。又鼻口<sub>青</sub>時<sub>時</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<sub>青</sub>時<sub>小</sub>。又<sub>鼻</sub>孔<sub>不</sub>利<sub>又</sub>常<sub>汗</sub>熱<sub>出</sub>。

候又<sub>是</sub>氣<sub>下</sub>而<sub>安</sub>。又<sub>鼻</sub>終<sub>小</sub>便<sub>上</sub>吐<sub>時</sub>起<sub>是</sub>癰<sub>候</sub>。又<sub>耳</sub>鼓<sub>目</sub>時<sub>直</sub>。又<sub>目</sub>閉<

脈絕亦依方與湯

又直視腫子動 腹滿轉鳴 下血身熱 口噤不得乳 反張脊強 汗出發熱 為臥不悟 手足

又小兒驚啼眠中四肢攣動變蒸未解慎不可針灸瓜之動其百脈仍因驚成癰也惟陰癰喉症可針灸爪之凡灸癰當先下兒使虛乃承虛灸之未下有實而灸者氣逆前後不通殺人也

又癰平旦發者在足少陽 黃昏發者在足太陰 日中發者在足太陽 夜半發者在足少陰 人定發者在足陽明 晨朝發者在足厥陰 右癰發時節病所在視其發早晚及其所也

又五藏之癰六畜之癰或在四肢或在腹內當察其候隨病所在灸之雖少必差若失其要則為害也

肝癰之為病也青黃反視手足搖

尚德按陽  
明太陰十  
金作足少  
陽厥陰

又按千金  
肝肺太  
陰上有手  
陽明三掌

尚德按手  
金作骨  
又按延十  
金作按

通按肘戶  
兩脚頭延

尚德按一  
法二字千  
金在太字  
上無二字  
又按千金

尚德按大  
人于金作  
又按關千

脾癰之為病面黃腹大泄痢  
又胃管三壯  
又肝管二壯  
又脾管一壯

肺癰之為病面目白沫出  
又肝管二壯  
又脾管一壯

腎癰之為病面黑目正直視不搖如尸壯  
又心下二寸二分三壯  
又又足太陽少陰各二壯  
又按千金

腸癰之為病目反四肢不舉  
又風府又項上二壯  
又中下臂承筋皆隨年壯

又馬癰之為病張口搖頭鳴欲反折  
又項中風府中三壯  
又馬蹄末服

牛癰之為病目正直視腹脹  
又三壯  
又足太陽  
又反未服

雞癰之為病延頸反折喜驚自搖  
又三壯

羊癰之為病喜揚目吐舌  
又三壯

猪癰之為病喜吐沫  
又三壯

犬癰之為病手屈拳擊  
又三壯

凡諸反張大人脊下容剛手  
又三壯

在顛上此最要處也  
又三壯

受解耳門張開口則次  
又三壯

背高骨次  
又三壯

是也  
又三壯

九處兒生十日可笑三壯二十日笑五壯五十日笑七壯  
又三壯

艾使熱炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷無益也  
又三壯

又若腹滿短氣轉咽  
又三壯

次六分之間穴去心四寸是人下寸是也  
又三壯

腹部分之十二處胸堂巨關胃管十日兒三炷一月以上可五炷陰下經三炷或云隨手壯以笑之  
又三壯

小兒時息在處摩薄壁生者癰及諸疾方并灸法十八首



金作問

尚德按問  
千金作問

尚德按以  
茵芋丸以  
下疑當補  
書  
又按千金  
甘草三兩

一月以上矣五壯

又若脊強反張灸大椎止足諸髓俞及督脊上當中央從大椎度至右背部一十二處十日兒灸三壯

又若手足掣癱驚者灸足次明陽次少陽次少陰次太陰次厥陰次合次間次三陽次少右手部一十六處其

要者陽明少陽心主足澤合谷少商也壯數如上

又灸伏次三里次陽明次太陰次少陰次厥陰次合次間次三陽次少右足部一十四處皆要可灸如上壯數手足陽

明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之若風病大動手足掣癱者盡灸手足十指端又灸本節後

又論曰若病家始發便來告師師可診候所解為法作次序療之以其節度首尾取差也病家已經難療無次序不得制病病則變異其本候後師便不知其前證虛實直依其後證作療亦不得差也要應精問察之為前師賢者所配依取其前蹤續以為療乃無逆耳前師處湯本應數劑乃差而病家服一兩劑求

效便謂不驗已後更問他師師不尋前人為療寒溫次序而更為療而不依次前師療則斃也或前已下之後須平和療以接之而得差也或前人未下之或不去者或前療寒溫失度後人應調理之是為療敗病皆須邀射之然後免耳不依次第及不審察必反重斃也又茵芋丸療少小有風癇疹至長不除或遇

天陰節變便發動食飲堅強亦發百脈攣縮行步不正言語不便者服之不發方茵芋丸鉛丹熬鉤藤

又杜衡 防葵 石膏 研秦芫各四 菖蒲 黃芩各六 松蘿二 蛻蝦十枚 甘草十四 右十二味搗篩

丸如小豆三歲以下服五丸三歲以上服七丸五歲以上服十丸十歲可至十五丸大小量之

又神農本草經說小兒驚癇有一百二十種其證候微異於常便是癇候也初出胎血脈不致五臟未成

稍將養失宜即為病也時不成人其經變蒸之後有病餘證並寬唯中風最暴卒也

又小兒四肢不好驚掣氣息小異微作癇

又凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益及變蒸日滿不解者並宜龍膽湯也方在客中若不時下則成大病病成則難療矣及下四味紫丸最

尚德按手  
金翼字上  
有生字當  
作常

尚德按  
千金翼作  
持之二字

尚德按手  
金翼下字  
下更有下  
字無料紫  
九三子數  
日下有四  
可矣下四

善雖下不損人足以去痰若四味紫丸不得下者以赤丸下之赤丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡  
當按方作龍膽瀉肝積服之并摩赤膏風癩亦當下之後以猪心湯下之驚癩但按圖灸之及摩膏不可  
大下也何者驚癩心氣不定下之內虛益令甚耳驚癩甚者時為難治如養小兒常慎驚勿令兒聞大聲  
抱持之間當安徐勿令怖也又天雷時便掩塞兒耳并作餘細聲以亂之  
凡養小兒皆微驚以長血脈但不欲大驚乃大驚灸驚脈若五六十日灸者驚復重甚生百日後又驚脈  
乃善

治少小兒腹熱除熱并參赤膏方 丹參 雷丸 芒硝 戎鹽 大黃

浸四種一宿以成鍊猪脂一斤煎三上三下去滓內芒硝膏成以厚心下冬夏可用一方但丹參雷丸  
亦佳 並出  
五卷中

千金翼凡小兒之癩有三種有風癩有驚癩有食癩然風癩驚癩時時有耳十人之中未有一二是食癩  
者凡是先寒後熱發癩者皆是食癩也驚癩當按圖灸之風癩當與豚心湯下之食癩當下乃愈紫丸佳  
凡小兒所以得風者緣衣暖汗出風因而入也風癩者初得之時先屈指如數乃發作此風癩也驚癩者  
起於驚怖先啼乃發作此驚癩也驚癩微者急療急復驚之或自止也其先不啼乳吐變熱後發癩此食  
癩也早治則差四味紫丸逐澀飲最良去病速而不虛人赤丸差狀病重者當用之

小兒衣甚寒薄則腹中乳食不消其大便皆酢臭此欲為癖之漸也便將紫丸以微酒之服法先從小起  
常令大便稀勿使大下也稀後便漸減之尿不酢臭乃止藥

又凡小兒冬月下無所畏夏月下難差然有病者不可不下後腹中當小脹滿故當節哺乳將紫丸數日  
又乳哺小兒常令多少有常制兒漸大當稍稍增之若減少之此腹中已有小不調也便微服藥停哺但  
與乳甚者十許日微者五六日止哺自當如常若不肯哺而欲乳者此是癖為重要當下之無不差者不  
下則致寒熱或反吐而發癩或更致下癩此皆病重不早下之所為也此為難療



又凡小兒有熱不飲哺乳臥不安又數驚此痢之初也服紫九便愈不差更服之兒立夏後有病療之慎勿妄灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏摩之入臍中以膏塗之令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之

又凡小兒尿黃而臭者此腹中有熱宜微將服龍膽湯若白而酢者此寒不消也當服紫九微者少與藥令內消甚者小增令小下皆通節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過此傷矣並出第十卷中

備急療少小百二十種痢病胸中病蛇蛻皮湯方 蛇蛻皮三寸 細辛 甘草炙 鈞藤 黃耆各二分 大黃

四蛇蟬四枚 牛黃五分 豆許 右八味切以水二升半煮取一升一合百日兒一服二合甚良窮地無藥物

可一二味亦合不可備用然大黃一味不得常用效

又療少小二十五癰大黃湯方 甘草炙 大黃 甘皮 當歸各一兩 細辛半兩 右五味搗節以指撮著水

一升者取二合一歲兒服一合日二

古令錄驗赤湯療二十五種癰吐痢寒熱百病不乳哺方 大黃五兩 當歸 芍藥 黃芩 括蕒 甘草

炙桂心 人參 赤石脂 牡蠣熬 紫石英 麻黃去節各二兩 右十二味搗節令調盛以韋囊八歲兒

以乾棗五枚用水八合煮棗取五合兩指撮藥入湯中煮取三沸去滓與兒服之取利微汗自除十歲

用棗十枚三指撮藥水一升煮三沸服之此湯療小兒百病及癰神驗

又療未滿月及出月兒壯熱發癰鈞藤湯方 鈞藤一分 蛇蟬一枚 柴胡 升麻 黃芩各二分 蛇蛻皮二寸

甘草炙 大黃各二分 竹瀝三石膏三分 右十味切以水一升者取三合半和竹瀝服一合得利見湯色

出停後服至五六十日兒一服一合乳母忌海藻松菜等唯以去若連發不醒

又療百日及過百日兒發癰連發不醒及胎中帶風體冷面青反張宜服麻黃五癰湯方 麻黃去毛活

乾薑 甘草炙 枳實各二分 杏仁二十枚 升麻 黃芩 大黃各四兩 柴胡 芍藥各三 鈞藤皮一分 蛇蛻皮三寸

蚱蟬二枚吳 石膏六分

右十五味切以水二升并竹瀝五合煎取六合每服一合佳

小兒驚悸方二首

必效鉤藤湯療小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出方

鉤藤 人參 蚱蟬炙子各一 蛇蛻皮三寸 龍齒

分四防風 澤瀉各二 石膏一斤 兩竹瀝合三

右十味切以水二升并竹瀝煎取七合細細服之以差為度

又方 牛黃兩大 豆 蚱蟬炙各 龍齒

麥門冬去心各 人參分三 鉤藤分一 茯苓 杏仁十二 蛇蛻皮三寸 炙

右九味切以水二升煎取六合去滓下牛黃末分六服消息服之令盡差

小兒夜啼方一十首

小品療小兒夜啼一物前胡丸方

前胡隨多少

右一味搗篩蜜丸如大豆服一九日三加至五六丸以

差為度千金

又方 以姪娠時飲食偏有所思者以哺兒則愈千金

千金療小兒夜啼不已醫所不治者方 取狼糞中骨燒作灰水服如黍米粒一枚即定

又療小兒夜啼至明不安寐芎藭散方

芎藭 防己 白米各二

右二味搗篩以乳和之與兒服之

量多少又以兒母手掩臍中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒未能服散者以乳汁和之服如麻子一凡

又方 交道中土 伏龍肝各一

右二味以綿篩水和少許服之差

又方 取馬骨燒灰敷乳上飲兒啼即止並出第

備急或常好啼方 取犬頭下毛以絳囊盛擊兒兩手立效

必效小兒夜啼方 以日未出時及日午時仰臥著於臍上橫文屏氣以朱書作血字其夜即斷聲效

古今錄驗小兒夜啼如腹痛方

蟻蟲乾令 芍藥 芎藭各

右三味搗末服如刀圭日三以乳服之

又療小兒夜啼不止腹中痛宜以乳頭散方

黃耆 甘草炙 當歸 芍藥 附子炮 乾薑各 右六

味為散以乳頭飲兒兒可胡豆三九大小量之



小兒驚夜啼方七首

廣濟療小兒五驚夜啼龍角丸方 龍角 黃芩 大黃各二 壯丹皮一分 炸蟬一枚 牛黃小豆大 右六

味搗篩蜜和丸如麻子少小以意增減之甚良 千金壯丹作壯蠟

千金療小兒驚啼方 以雞屎白熬末以乳服少許

又方 以臘月縛猪繩燒灰服之

又方 燒蠟皮三寸灰著乳頭飲兒

又方 車轆脂如小豆許內口中及臍中差

又小兒因宿乳不消腹痛驚啼牛黃丸方 大附子二枚 炮 牛黃三 巴豆去心 杏仁去皮 真珠各一兩 研 右

五味搗附子真珠下篩別搗巴豆杏仁合如膏內附子及牛黃搗一千二百杵若乾入少蜜足之百日

兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之隔上下悉當

微轉藥完出者病愈散出者更服 並出第

文仲隱居效方小兒夜啼不安此腹痛故至夜輒劇狀似鬼禍五味子湯方 五味子 當歸 芍藥

白朮各四 甘草炙 桂心各二 右六味切以水一升煎取五合分服之增減量之

小兒客忤一十首

千金論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人為客忤也雖是家人或別房異戶或乳

母父母從外還衣服或經履鬼神靈氣或牛馬之氣皆為忤也發作喘息乳氣未定者皆為客忤其

乳母遇醉及房勞後乳兒最劇能殺兒也不可不慎

又論曰凡中客之為病皆嘔吐下青黃白色水穀解離腹痛天糾面色變易其候似癰但眼不上插耳其

脈急數者是也宜與龍膽湯下之

又龍膽湯厚嬰兒出腹血脈盛實熱溫壯四肢驚掣發熱大吐現者若已能進哺中食不消壯熱及變蒸

尚德按此  
經當作腦

尚德按此  
字下疑脫

尚德按此  
千金作錢

尚德按此  
千金作錢

尚德按此  
類皆

尚德按此  
千金作下

有寒字之  
作鬼主之  
下有十歲  
已下四  
魁作魁  
又披千金  
蠅頭二枚

尚連按  
字下千金  
有咽字  
尚連按  
生千金  
顛上

通換護  
之特重  
歲兒者凡  
兒俱當慎  
尤當慎重  
也  
一云護之  
特異中者  
或避之手  
黑關中即  
下勿令見  
之意

不解中客人魁氣並諸驚癇方卷主之小兒龍膽湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長大

者以次依此為例若必知客忤及有魁氣者可加人參當歸各加龍膽科分多少也一百日兒加半分二

百日兒加一分一歲兒加半兩餘藥皆準爾 龍膽 鉤藤皮 柴胡 黃芩 桔梗 芍藥 茯神

甘草 一分各 蠅頭 二分 大黃 四分 右十味切以水一升煎取五合為劑也服之如後節度藥有虛實虛藥

宜足數合水也兒生一日至七日分取一合為三服生八日至十五日分取一合半為三服生十六日

至二十餘日至四十日者盡以五合為三服十歲亦準此得下即止勿復服也

又少小卒客忤不知人者方 取新熟馬屎一枚絞取汁飲兒下便愈亦治中客忤而嘔啼面青腹強者

又少小見人來卒不佳腹中作聲者二物燒髮散方 用向來者人頭生髮十莖斷兒衣帶少許合燒反

細末和乳飲兒即差

又少小中忤人一物馬通浴湯方 用馬通三升火燒令烟盡以酒一斗煮三沸去滓以浴兒即差

又凡乘馬行還得汗氣臭又未盥洗易衣裝而便向兒邊令兒中馬客忤兒忽卒見馬來及聞馬鳴驚及

馬上衣物馬氣皆令兒中馬汗氣及客忤慎護之特重一歲兒也

又凡非常人及諸物從外來亦驚小兒致病欲防之法諸有從外來人及有異物入戶當將兒迴避之勿

令見也若不避者即燒牛糞令有煙氣置戶前則善

又方 吞麝香如大豆許立愈

又療少小客忤二物黃土塗頭方 以甕中黃土熟者曲蟻糞等分合搗如雞子黃大塗兒頭上及五心

良 尚德按合搗下千金有水和泥 又療卒客忤方 剪取驢前膊脾土旋毛大如彈丸以乳汁煎之令毛消藥成著乳頭飲之下喉即愈

又療小兒犯客忤發作有時方 取母月衣覆兒上大良

又療小兒卒客忤方 銅鑑鼻燒令赤投少許酒中大兒飲之小兒不能飲者含與之即愈 並出第



小兒癰癰方六首

通按雙即  
是霜

南德按紫  
霜之名取

之服二丸  
例見第三

十六卷中  
千金紫變

丸下

尚德按十  
錄千金作

錄二兩半  
錄是分之

下同

尚德按珠  
千金作朱

下同

明發明砂

即端以

通按仙

明發明砂

明發明砂

廣濟療少小及大人腹中宿食積成癰癰兩脇妨滿氣急喘急不能食面黃日漸瘦腹大脹硬除百病紫  
雙丸方 代諸 研丹砂 研大黃 各八 青木香 當歸 各五 桂心 各四 犀角 各三 巴豆 各六 右八味搗篩蜜和

丸如梧子大人小兒量之十歲兒服大豆二丸六歲者小豆許二丸以下臨時斟酌要瀉病出為度久  
疾日一丸以瀉洩而已不在猛瀉忌如常法

又療小兒疳瘕發腹痛不食黃瘦癰甲丸方 癰甲 各八 郁李仁 各八 防葵 人參 各五 訶黎勒 各五 大黃  
分四 桑菌 分三 右七味搗篩蜜丸大小量之以酒飲乳服五丸至十丸

千金半黃蠶甲丸療小兒癰癰腫壯熱食不消化中惡忤氣方 牛黃 各二 癰甲 各五 麥鉤 各五 柴胡 大黃  
枳實 各五 芩藳 各二 厚朴 各二 桂心 茯苓 芍藥 乾薑 各半 右十二味搗篩蜜丸如小豆日三服以

意量之  
又療小兒心下生疳疾癰結聚腹大脹滿身體壯熱不欲哺乳芫花丸方 芫花 黃芩 各四 大黃 雄  
黃 各十 右四味搗篩為末蜜和更搗一十杵三歲兒至一歲以下服如粟米一丸欲服丸內兒喉

中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避良  
又療小兒疳瘕結聚宿癰羸瘦不能飲真珠丸方 真珠 各半 麥門冬 各一兩 雞仁 各五 杵一 巴豆 各七  
皮 各一 右四味搗篩蜜和丸期歲兒服二丸小豆大二百日兒服如麻子二丸漸增以知為度當

下病赤黃白黑葵汁勿絕藥病盡下自止久服令小兒肥白無病已試驗  
劉氏療小兒冷癰疳瘕氣不下食瘦時時肋下痛方 防葵 當歸 枳實 各五 厚朴 各五 桂實 人參 黃  
耆 茯苓 白朮 訶黎勒 皮 各八 郁李仁 各五 柴胡 大麻仁 芍藥 各五 橘皮 防風 紫苑 各五 薤

白仁 各六 蠶甲 各三 棧根 各二 桂心 各七 仙鼠 各二 合代 以大附子 各二 乾薑 各二 甘草 各二 乾地黃 大  
黃 各十 五味子 各四 檳榔 各四 牛膝 各一 右三十味搗篩蜜丸如梧子大小增減以意量之須飲服之良

黃 各十 五味子 各四 檳榔 各四 牛膝 各一 右三十味搗篩蜜丸如梧子大小增減以意量之須飲服之良

黃 各十 五味子 各四 檳榔 各四 牛膝 各一 右三十味搗篩蜜丸如梧子大小增減以意量之須飲服之良

尚德換千  
金芒硝四  
兩已豆二  
百枚十九  
作一丸二  
十九作二  
九加作如

尚德換下  
食千金作  
食自下三  
字

尚德換哺  
字上千金  
有乳字

尚德換千  
金芒硝五  
銖麥門冬  
六銖甘草  
當歸各十  
二銖下利  
作得下

小兒痰結方二首

千金療少小宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消瘦芒硝紫丸方 芒硝四分 大黃四分 半夏二兩 代赭兩

甘遂二兩 巴豆二兩 杏仁一百二 右七味搗篩別治巴豆杏仁令如膏搗數千杵令相和如強

內少蜜百日兒服如胡豆十九丸過百日至一歲服二十丸隨兒大小以意節度之當候兒大便中藥出

為愈若不吐復與如方中第五

古今錄驗療八歲以上兒熱結痰實不能下食方 大黃十二分 柴胡九分 黃芩 知母各二分 升麻十分 枳實是

杏仁各六分 芍藥 施子各八分 細辛二分 竹葉切一分 右十一味切以水六升煮取一升八合分四服十

歲兒分三服以下以意消息多少量之千金有結稅黃連細枳實杏仁

小兒因食滯高羸瘦不下食肚脹方四首

小品療四五歲兒因食及在胎中宿熱乳母飲食羸瘦辛苦乳汁不起兒哺不為肌膚心腹痞滿痿黃瘦

瘠四肢痿痺緣度服之令先悅方 芍藥十分 黃耆 豨甲是 人參各四分 柴胡八分 茯苓六分 甘草 乾薑

各四分如熱 右八味搗篩蜜和為丸如大豆服五九日二服忌如常法千金有大黃無黃耆云服一歲以上乳服三九七歲

千金療少小傷寒久病不除差復劇羸瘦骨立五味子湯方 五味子十分 大黃六分 芒硝五分 麥門冬六分 石

膏兩 甘草是 當歸 黃芩 黃連 前胡各一分 右十味切以水三升煮取一升半服二合下利即止

效

又療小兒羸瘦腹脹常服不妨乳方 甘草五兩 右一味搗篩蜜丸如小豆一歲兒服十九日三歲即

更合五卷中

劉氏療小兒肚脹新度不食四肢熱不潤方 甘草是 豨甲是 柴胡 茯苓各六分 訶梨勒皮十分 檀

柳各三 芍藥 橘皮各三 生薑 當歸各四分 知母五分 大黃八分 右十二味切以水一升半煎取七合

小兒因食滯高羸瘦不下食法方四首



分為數服得瀉為差

小兒食不下及不消不嗜食方四首

廣濟療小兒心腹滿嘔食不下地黃飲子方 生地黄汁 生薑汁各三 訶梨勒四分 白蜜一匙 右四味

相和調勻分溫服之微利尤良

小品療小兒宿食不消發熱丸味當歸湯方 當歸 甘草炙 芍藥 人參 桂心 黃芩 乾薑各一分

大薑五 大黃一分 右藥切以水一升半煎取六合去滓分服

千金療少小五六日不食氣逆桂心橘皮湯方 桂心兩 橘皮三兩 雞白切五 黍米合五 人參兩 右五味切

以水七升先煮藥取二升次下雞米熟湯成稍服之

又療少小胃氣不調不嗜食生肌肉地黃丸方 乾地黄 大黃各五 茯苓三 當歸 柴胡 杏仁各二

右六味末之以蜜丸如麻子大服五丸日三服並出第五卷中

小兒霍亂方一十二首

廣濟療小兒霍亂心腹刺痛吐痢方 茯苓 桔梗 人參各六 白朮五 甘草炙 厚朴各四 右六味切

以水二升煮取六合去滓溫服之

又療小兒霍亂嘔吐不止方 人參六 厚朴三 陳倉米三 右三味切以水三升煮取七合去滓分服

之

千金療小兒吐痢霍亂方 人參四 厚朴炙 甘草各二 白朮三 右四味切以水一升二合煮取五合六

十日兒服一合百日兒分三服期歲兒分再服乳母忌油膩等

備急療小兒霍亂吐痢方 人參四 厚朴炙 甘草各二 乾薑一 白朮三 右五味切以水一升煮取四合

分服之

又療孩子霍亂已用有效方 人參 蘆薈各二 扁豆藤二 倉米一 右四味切以水二升煮取八合分

尚隨病  
擬當作療

通使能即  
葉耳也  
音詩  
尚德使李  
時珍本草  
牛下引  
方龍作  
龍無鳥半  
之稱又  
龍龍龍  
近故批

服

又方 人參分四生薑分三厚朴分二白朮 甘草分二 右五味切以水一升煮取四合分服

又方 人參分四木瓜分一倉米分一 右三味切以水一升煮分服以意量之立效

必效主小兒霍亂方 取廁屋戶簾燒灰研以飲服一錢也

又方 訶黎勒一枚 右一味先煎沸湯研一半許與兒服立止再服神妙

古今錄驗療小兒霍亂吐痢人參白朮湯方 人參分六白朮 茯苓分四厚朴分二甘草分三 右五味切以水一升半煮取六合分溫服立效

劉氏療百日以來及葦內霍亂方 以人乳半合及生薑汁少許相和煎服入口定

又療小兒霍亂方 生薑分四香薷 薄荷各一 右三味以水煎分溫兒與母俱服之甚良

小兒霍亂雜病方六首

劉氏療小兒霍亂空吐不痢方 人參分六生薑分四厚朴分二橘皮分一兔骨分一 右五味切以水一升二

合煎取四合服之即利下部又以杏仁鹽少許皂莢末少許麵和硬澁如棗核大以綿裏內之便通痢

母忌熱麵大效

又療小兒霍亂空利不吐方 烏牛蒺藜分一生薑 人參分三 右三味切以甜不醋漿水一升半煎取

五合分服之如孩子渴取曲蟻糞爛龍骨一兩以漿水煎澄清與兒喫即差

又療小兒霍亂不吐不痢肚脹妨滿上下不通方 甘草分四當歸分二石鹽分三 右三味切以漿水一升

半煎取六合去滓牛黃屑香各半錢已研蜜半匙相和以下灌之即通嫡母與漿水粥喫勿喫麵肉等

又小兒乾霍渴熱及壯熱眼色慢四大因悶方 以烏豆一升淨乾擇生薑一兩切以水三升煎烏豆皮

欲爛即濾取汁二合和少許蜜喫即變吐如人行六七里又與喫無問大人小兒並與服之效

又療小兒熱霍諸藥不差方 以蘆葉二大兩糯米三大合水三升先煮葉入米煮取一升入蜜少許和



服即差不足即取桑葉二升生薑半兩切以水三升者取一升著一匙白米為飲服

又療小兒霍亂吐痢不止方 以人乳汁二合生薑汁粟米許豈薏取仁碎似蕎麥大二七枚遂陰一小

把龍骨六分以乳煎取一合著少許牛黃麝香兔毛灰等和分為三服如渴以糯米汁著蜜與喫即差

小兒吐痢方四首

千金療小兒吐痢方 以亂髮灰二分鹿角一分作末以米飲服一刀圭日三

又方 以熱牛矢汁灌之

又方 燒猪矢水解取汁少少飲兒

劉氏療百日以下羸內兒吐痢方 鈔一錢乳汁四合龍骨六分 右三味煎龍骨和炒鈔服之即差

小兒噦方二首

備急療小兒噦方 以生薑汁 牛乳各五 右二味合前五合分二服

又方 以羊乳一升者減半分五服與用牛乳代之

小兒口噤方四首

千金療小兒口噤方 以鹿角粉之大豆末之等分和乳塗乳飲兒

又方 以驢乳二升猪乳一升合前得一升半服如杏仁三四服差

備急療小兒口噤并噤方 礬石燒硃砂各半 右二味和研令極細敷兒舌上日三以亂髮洗舌上垢

頻頻令淨即差

古今錄驗療小兒噤其病在咽中如麻豆許令兒沫不能乳哺方 取水銀如黍米與服覺病無早晚水

銀下咽便愈以意量之不過小麻子許與可也

小兒重舌方一十三首

千金療小兒重舌方 灸行間隨年壯穴在足大指拇中是

尚德按千金諸乳二升

尚德按小  
千金翼作  
大

尚德按一  
斗千金作  
五升

又方 取田中蜂房燒灰酒和薄喉下愈

又方 以蠶中黃土末苦酒和塗舌上

又方 以赤小豆末和醋塗舌上

又方 取鏡裏舌燒灰敷舌上

又方 黃柏竹瀝清取細細點舌上良

又方 兒童舌舌強不能收唾燒蛇脫末以雞毛蘸展藥掠舌下愈

千金療小兒重舌方 取三屠家肉各如指大以摩舌上兒立能乳便啼

又方 以衣魚燒作灰以敷舌上千金云衣魚舌上

又方 兒童舌舌強不收唾者鹿角末如小豆許著舌下數數與之

又療小兒重舌口中瘡涎出至多方 以蒲黃敷舌上不過三度愈

古今錄驗療兒重舌欲死方 灸右足踝三壯立愈又灸左右並良千金云灸兩足外踝

又方 取亂髮燒灰末敷舌上甚佳

小兒鵝口驚口方六首

千金療小兒心藏熱口為生瘡重舌鵝口方 取柘根剉五升無根只以弓材佳 右一味以水一斗煮

取二升以汁更煎取五合細細拭齒數次良

又方 口生瘡白澁澁取桑木汁先以父髮拭口次以桑汁塗之

又療小兒鵝口不能飲乳方 取白鵝屎汁瀝口中良

又方 取黍米汁塗之

又方 取父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井花水東向日以髮拭口中得口中白乳以置水中七過漚洗三

朝作之



救急療小兒驚口兩吻生瘡方 取疑灰以豬脂和塗之千金

小兒口瘡方五首

小品療小兒口爛瘡方 取羊乳細細瀝口中不過三度差

千金療小兒口瘡方 大青紅黃連紅 右二味切以水三升煮取一升二合一服一合日再夜一

支仲文太醫療小兒口瘡方 桑木白汁 生地黃汁各一 赤蜜合 右三味和燒敷兒口中瘡便差

救急療小兒口瘡方 以蛇脫皮水漬令濕軟拭口內瘡一兩遍即差

劉氏療小兒口瘡方 黃柏皮切 兩 烏豆升 右二味以水二升煮取兩合去滓重煎如餲入少許龍腦

香研和敷之甚良

小兒口中涎出方三首

千金療小兒口涎出方 以白羊尿內口中差

又方 以東行牛口中沫塗兒口中及頤上

又方 桑白汁塗之差

小兒舌上瘡唇腫方五首

小品療小兒唇腫及口赤生白爛方 清旦研桑木白皮取汁以塗兒唇口即差

又小兒舌上瘡方 烏賊魚骨燒末以雞子黃和塗之至喉咽舌上遍敷即差止

千金療小兒舌瘡方 蜂房燒灰屋間塵各等分和先洗瘡使乾敷之效

又方 羊蹄骨中生髓和胡粉敷上日三取差

又舌腫強滿口方 滿口含糖醋少時熱氣通愈

小兒咽喉生瘡方二首

千金療熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入者膏方 當歸 射干 升麻各一 附子半 白蜜四 右五味

尚德按千金猪膏白蜜各一兩合作含

尚德按三升金作二

尚德按千金以水二升五合煮

尚德按稽疑當作胡麻葉也顧疑當作顯

切以猪膏四兩先煎之令成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色黃藥成去滓投蜜更上火

一兩沸以器盛之取杏仁許含之日四五咽之無妨大人小兒並用妙

又療口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

猪脂一斤黃連兩白蜜升右三味合煎令成膏去滓合半棗大日四五夜亦含之

小兒喉痹方四首

千金升麻湯主小兒喉痹痛若毒氣盛便咽塞並大人喉咽不利方

生薑升麻射干各三橘皮兩右四味切以水六升煎取二升分溫三服

又療小兒卒毒腫著喉頸壯熱妨乳方

升麻射干大黃各一右三味切以水二升半煮取八合一歲兒分三服餘滓數腫處冷更煖而薄大兒以意加之

又方煮桃皮汁三升服之又燒荆瀝汁服之

劉氏療小兒喉痹熱塞方

升麻五兩馬蘭子合右二味以水一升煎取二合入少白蜜與兒服之甚良

小兒聾耳方四首

千金療小兒聾耳方

末石硫黃以粉耳中日一夜一差

又療少小聾耳方

桃仁熟末以豉許裏塞耳中

古今錄驗小兒聾耳方

青羊屎暴乾以綿裏塞中即差

又小兒聾耳有瘡及惡肉數耳雄黃散方

白麻搗取皮合花燕脂十

一兩度差方無雄黃未詳其名

右二味搗篩細研敷耳中令滿

小兒鼻塞方四首

千金療小兒鼻塞不通濁涕出方

杏仁分椒出附子去皮細辛各一

右四味切以醋五合漬藥一宿明

小兒喉痹方四首小兒聾耳方四首小兒鼻塞方四首



十三  
早以猪脂五合煎令附子色黄膏成去滓待冷塗繁導鼻孔中日再兼摩頂上  
又療小兒鼻塞生息兩方 通草 細辛各一兩 右二味搗篩以綿纏如棗核大藥如豆著綿頭著鼻孔

中日二


古今錄驗療小兒鼻塞不通細辛膏方 細辛 通草各一分 辛夷仁一分 杏仁二分 右四味切以羊髓

三合猪脂三合緩火煎之膏成絞去滓取一米粒許大以內鼻孔中頻易差

劉氏療小兒鼻塞不通喫乳不得方 醍醐三青木香 零陵香各四分 右三味切和前成膏取少許以

膏和搗為丸或以膏塗兒頭上及塞鼻中以通佳







W2467W

1915

V. 34-351